

长 0.5—0.8 毫米, 钝三角形; 叶片两面有桔黄色腺点, 腺点脱落后呈现小窝等性状可以区别。




图 53 玫花豆腐柴 *Premna punicea*
C. Y. Wu (史涓清绘)




图 54 红腺豆腐柴 *Premna rubroglandulosa*
C. Y. Wu (史涓清绘)

23. 麻叶豆腐柴 (云南植物志) 筋骨散 (云南药用植物名录) 图 55

Premna urticifolia Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 458. 1917; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 227. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 64. pl. 9. 1932; 中国高等植物图鉴 3: 592. 1974; 云南植物志 1: 429. 图版 102, 17—20. 1977.

灌木, 高约 1—3 米; 幼枝疏生柔毛, 老枝无毛, 有圆形或椭圆形细小皮孔。叶片薄纸质, 卵形, 长 3—9 厘米, 宽 2—6 厘米, 顶端渐尖, 基部心形至圆形, 两面疏生短毛, 沿叶脉较密, 两面有桔黄色腺点, 脱落后呈现小窝; 叶柄有卷曲柔毛, 长 1—4 厘米。聚伞花序在小枝顶端紧缩呈头状, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 有长 1—2.6 厘米的花序梗; 苞片线形, 密生短柔毛, 长约 6 毫米; 花柄密生柔毛和腺点; 花萼杯状, 长约 2 毫米, 两面有柔毛和腺点, 5 裂微呈二唇形, 裂片长 0.5—0.8 毫米, 钝三角形; 花冠淡红色, 长约 6 毫米, 4 裂成二唇形, 上唇 1 裂片全缘, 在芽时盖着下唇 3 裂片, 外面疏生柔毛和腺点, 花冠管长约 3 毫米, 喉部密生一圈长柔毛; 子房无毛, 顶端密生黄色或紫红色腺点。核果黑色, 卵形, 长 3—5 毫米, 宽 2—4 毫米, 结果时花萼短于果实。花果期 7—9 月。

产云南南部。生于海拔 1600 米的山坡丛林中。模式标本采自云南思茅。

根祛风湿、强筋骨、止痛, 治脉管炎、风湿性关节炎、筋骨疼痛、腰痛、胃痛、吐血 (《云南

药用植物名录》)。



图 55 麻叶豆腐柴 *Premna urticifolia*
Rehd. (史渭清绘)



图 56 草坡豆腐柴 *Premna steppicola*
Hand.-Mazz. (陈荣道绘)

24. 小叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna parviliba P'ei in Mem. Sci. Soc. China 3 (2): 62. 1932; 云南植物志 1: 428. 1977. — *Celastrus yunnanensis* Lévl. Cat. Pl. Yunnan, 32. 1915, non est *Premna yunnanensis* W. W. Sm., nec P. Dop.

灌木; 幼枝纤细, 脆弱, 密被柔毛。叶片纸质, 披针形或卵状披针形, 长 0.5—3.8 厘米, 宽 0.3—1.1 厘米, 顶端钝, 基部圆形, 边缘上部有少数锯齿, 两面被散生柔毛, 侧脉 3—4 对, 在表面下陷, 背面隆起; 叶柄长 2—6 毫米, 圆柱形, 密被柔毛。圆锥状伞房花序小, 直径不超过 2.5 厘米, 有少数至 25 朵花, 被柔毛和腺点; 苞片披针形, 长约 4 毫米; 花序梗长约 5 毫米, 花柄长约 2 毫米; 花萼 5 齿, 萼管长约 2 毫米, 外面被柔毛和腺点, 内面被腺点和少数毛; 花冠粉红色, 长约 6 毫米, 二唇形, 下唇凹, 外面被毛, 有腺点, 喉部被疏柔毛; 雄蕊略伸出花冠; 花柱无毛, 柱头短 2 裂, 有 1 或少数腺点; 子房顶部有少数毛和腺点。

特产云南金沙江河谷。生于海拔 400 米岩石上。

25. 草坡豆腐柴 (云南植物志) 图 56

Premna steppicola Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 902. 1936; 云南植物志 1: 430.