

有绒毛;花冠淡紫色或蓝紫色,长6—10毫米,外面及喉部有毛,花冠管内有较密的长柔毛,顶端5裂,二唇形,下唇中间裂片较大;雄蕊4,伸出花冠外;子房无毛,密生腺点;花柱无毛,柱头2裂。核果近圆形,径约5毫米,成熟时黑色;果萼宿存,外被灰白色绒毛。

花期7月,果期9—11月。

产福建、台湾、广东、广西、云南。生于平原、河滩、疏林及村寨附近。印度、越南、菲律宾、澳大利亚也有分布。

果实入药,治感冒、风热、神经性头痛、风湿骨痛;茎叶又可提取芳香油。

8b. 异叶蔓荆 (云南植物志)

Var. *subtrisecta* (O. Ktze.) Moldenke in *Phytologia* 3: 178. 1949; 云南植物志 1: 444, 图版 105, 4. 1977.——*Vitex ovata* Thunb. var. *subtrisecta* O. Ktze. *Rev. Gen. Pl.* 2: 510—511. 1891.

本变种主要特点:直立灌木。单叶,有时在同一枝条上有单叶和复叶共存。花期4—7月,果期9—11月。

产广东、云南西南部至东南部。生于海拔300—1700米的山地路旁或林中。缅甸、泰国、印度尼西亚、菲律宾、日本及太平洋诸岛也有分布。

8c. 单叶蔓荆 (拉汉种子植物名称) 图70

var. *simplicifolia* Cham. in *Linnaea* 107. 1832; A. Meeuse in *Blumea* 5: 73. 1942; Moldenke, *Résumé* 171. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 594. 1974.——*Vitex rotundifolia* Linn. f. *Suppl. Pl. Syst. Veg.* 294. 1781.——*Vitex ovata* Thunb. *Fl. Jap.* 257. 1784; Hook. et Arn. *Bot. Beech. Voy.* 206 et 268. f. 47. 1841; Sieb. et Zucc. *Fl. Jap. Fam. Nat.* 152. 1846; Chung in *Mem. Sci. Soc. China* 1 (1): 227. 1924.——*Vitex trifolia* Linn. var. *unifoliolata* Schauer in *DC. Prodr.* 11: 683. 1847; Benth. *Fl. Hongk.* 273. 1861; P'ei in *Mem. Sci. Soc. China* 1 (3): 100. 1932; 陈嵘, *中国树木分类学* 109. 1937.——*Vitex trifolia* Forbes et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 26: 258. 1890, non. Linn.——*Vitex trifolia* Linn. var. *ovata* (Thunb.) Makino in *Bot. Mag. Tokyo* 17: 92. 1903.

本变种主要特点:茎匍匐,节处常生不定根。单叶对生,叶片倒卵形或近圆形,顶端通常钝圆或有短尖头,基部楔形,全缘,长2.5—5厘米,宽1.5—3厘米。花和果实的形态特征同原变种。花期7—8月,果期8—10月。

产辽宁、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东。生于沙滩、海边及湖畔。日本、印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、澳大利亚、新西兰也有分布。

干燥成熟果实供药用,功能疏散风热;治头痛眩晕目痛等及湿痹拘挛(《海南植物志》)。