

本种形状特殊,易与属内各种区别。

系 5. 密序系——*Ser. Densiflora* Schauer in DC. Prodr. 11: 664. 1847; Briq. in Engler et Prantl. Pflanzenfam. 4 (3a): 175. 1897.

聚伞花序排列呈头状或紧密的伞房状,顶生、假顶生,少为腋生;花萼在结果时增大;花冠漏斗状或高脚碟状,花冠裂片不等,通常偏歪。叶片常为心形或宽卵形,少为椭圆形。

本系我国有 8 种、3 变种,主要分布西南、华南地区。

16. 长梗大青 (新拟) 长柄臭牡丹 (云南植物志) 图 88

Clerodendrum peii Moldenke, Known Geogr. Distrib. Verbenac. et Avicenni-
niac. 79. 1942; 云南植物志 1: 472. 图版 113, 5. 1977.——*Clerodendron longipetio-*
latum P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 159. Pl. 29. 1932, non Gürke.

灌木,高 1—3 米,少可达 7 米;嫩枝四棱形,密被黄褐色脱落性短柔毛,髓充实,干后不中空。叶片纸质,宽卵形或心形,长 6—17.5 厘米,宽 6.2—12.5 厘米,顶端渐尖,基部截形,宽楔形或心形,全缘或有波状稀疏小齿,嫩叶两面有微柔毛(脉上较密)和小腺点,老叶表面具稀疏短柔毛,背面无毛或仅主脉有稀疏短柔毛,基生三出脉,腋间有少数盘状腺体;叶柄长 6—11.5 厘米,被脱落性黄褐色短柔毛。聚伞花序紧密呈头状,腋生或假顶生;苞片卵状披针形或披针形,长约 1.9 厘米,被微柔毛和散生少数腺点,果时脱落;花萼杯状,外面具盘状腺体和短柔毛,长约 8 毫米,顶端 5 裂,裂片三角形,长约 2 毫米,果时可达 6 毫米;花冠红色或白色,花冠管漏斗状,长约 1.4 厘米;雄蕊 4,与花柱均伸出花冠外;柱头 2 浅裂。核果近球形,径 5—7 毫米,绿色,熟时蓝黑色,无毛,干时具皱缩的网纹,宿存花萼红色,稍增大,长不超过果,裂片常反展。 花果期 6—10 月。

产云南东南部至南部。生于海拔 1400—2400 米的沟边、路旁或阴湿林中。模式标本采自云南元江。

本种近似苞花大青 *Cl. bracteatum* Wall., 但后者小枝、叶柄、花序梗均密被黄褐色绒毛,幼叶、成熟叶两面密被黄褐色短柔毛和黄色珠状小腺点;苞片宿存,花序具花较多等特征可以区别。

17. 苞花大青 (新拟) 苞花颊桐 (云南植物志) 图 89

Clerodendrum bracteatum Wall. ex Walp. Cat. No. 1800. 1829. nom. nud;
Walp. Rep. Bot. Syst. 4: 106. 1844—48. descr.; Schauer in DC. Prodr. 11: 665.
1847; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 593, 1885; 云南植物志 1: 472. 图
版 113, 6. 1977.

灌木或小乔木,高 3—4 米,少可达 10 米。小枝略呈四棱形,植物体各部密被黄褐色的绒毛。叶片卵形或宽卵形,长 11—16 厘米,宽 6—10 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,微歪斜或近于截形,全缘或少数中部以上具浅锯齿,两面密被黄棕色或灰白色短柔毛和黄色或

桔红色珠状腺点，脉上密生短柔毛；叶柄长 2.5—4.5 厘米，密被短柔毛。聚伞花序密集成头状，腋生或假顶生，花序梗长 3.5—13 厘米；苞片卵形至椭圆形，长 1—3 厘米，顶端渐尖或尾状，被短柔毛和腺点，宿存；花萼红色，长约 1.6 厘米，质薄，外被短柔毛和小腺点及少数盘状腺体，里面无毛，有少数腺点，5 深裂，裂片卵状披针形，长约 1.1 厘米，渐尖；花冠白色，花冠管纤细，长 1.8—3.5 厘米，外被短柔毛和腺点，里面无毛，裂片长圆形，长 6—8 毫米；雄蕊及花柱均不伸出花冠外，雄蕊稍长于花柱或近等长。核果近球形，幼时绿色，成熟后转紫黑色，径约 6 毫米，包于稍增大的红色宿萼内。 花果期 7—11 月。

产云南西北部独龙江岸、西藏。生于海拔 900—1900 米的山坡竹林缘或阔叶林中。印度、锡金、不丹、孟加拉也有分布。

本种叶片宽卵形，聚伞花序密集成头状，苞片叶状，花萼裂片伸展等性状近似灰毛大青 *Cl. canescens* Wall.，但后者毛被灰褐色，为平展倒向着生的长柔毛，花序 2—5 枝顶生，叶片、苞片、花萼、花冠外面均无黄色腺点，花柱与雄蕊都伸出花冠外等特征可以区别。




图 88 长梗大青 *Clerodendrum peii*
Moldenke (史渭清绘)




图 89 苞花大青 *Clerodendrum bracteatum*
Wall. ex Walp. (韦力生绘)

18. 灰毛大青 (新拟) 毛赧桐(中国高等植物图鉴)，灰毛臭茉莉(云南植物志)，粘毛赧桐(海南植物志)，六灯笼(广东)，狮子球、人瘦木(广西)

Clerodendrum canescens Wall. Cat. No. 1804. 1829. nom. und.; Walp. in Nor.