

12243 号标本采集地点)及四川药源普查队 15550 号标本确应为本种。

Moldenke 在 *Phytologia* 23 (5): 453 页上发表产四川西部的 “*Caryopteris incana* var. *szechuanensis*”, 应为本种。因其原始记载 (……*foliorum uniforme* 2.5—3 cm. *longis* 1—1.5 cm. *latis regulariter grosse antrorse incis*is……) 及分布, 均在本种范围内。

组 2. 假蕨组——*Sect. Pseudocaryopteris* Briq. in Engler et Prantl. *Pflanzenfam.* 4 (3a): 178. 1897.——*Sect. Mastacanthus* Briq. in Engler et Prantl. *Pflanzenfam.* 4 (3a): 178. 1897, *pro parte*.

花序具苞片和小苞片; 花冠的裂片均全缘。

7. 单花蕨 (云南植物志) 蕨 (江苏南部种子植物手册) 图 106

Caryopteris nepetaefolia (Benth.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 22: 390. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 264. 1890; Matsuda in Bot. Mag. Tokyo 26: 340. 1912; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 229. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 173. 1932; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 630, 图 1022. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 605. 图 5163. 1974; 云南植物志 1: 483. 图版 115, 10—12. 1977.——*Teucrium nepetaefolia* Benth. in DC. Prodr. 12: 580. 1848.




图 106 单花蕨 *Caryopteris nepetaefolia*
(Benth.) Maxim. (蒋杏墙绘)

多年生草本, 有时蔓生, 仅基部木质化, 高 30—60 厘米; 茎方形, 被向下弯曲的柔毛。叶片纸质, 宽卵形至近圆形, 长 1.5—5 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 顶端钝, 基部阔楔形至圆形, 边缘具 4—6 对钝齿, 两面均被柔毛及腺点, 侧脉 3—5 对; 叶柄长 0.3—1 厘米, 被柔毛。单花腋生, 有长 1.5—3 厘米的纤细花柄, 近花柄中部生两枚锥形细小苞片; 花萼杯状, 长约 6 毫米, 结果时略增大, 两面均被柔毛和疏生腺点, 5 裂, 裂片卵圆形至卵状披针形, 有明显脉纹; 花冠淡兰色, 外面疏生细毛和腺点, 喉部通常被柔毛, 下唇中裂片较大, 全缘, 花冠管长 6—9 毫米; 雄蕊 4 枚, 与花柱均伸出花冠管外, 子房密生绒毛。蒴果 4 瓣裂, 果瓣倒卵形, 无翅,

表面被粗毛,不明显凹凸成网纹,长约4毫米,淡黄色。 花果期5—9月。

产江苏、安徽、浙江、福建。生阴湿山坡、林边、路旁或水沟边。模式标本采自我国东部。

全草祛暑解表,利尿解毒。治中暑、感冒、尿路感染、白带等症。浙江民间用全草作刀伤药;江苏用全草提制外用止血粉,效果良好。

本种近似三花莼 *C. terniflora* Maxim. 但三花莼腋生有3花,很少为5花;花萼披针形;果瓣倒卵状舟形,表面明显凹凸成网纹,可以区别。

《云南植物志》中的短柄单花莼 *C. nepetaefolia* (Benth.) Maxim. f. *brevipes* C. Y. Wu et H. Li 因仅有武素功8999号果实标本,他们亦认为需待有花标本再论证,故本书未引入。

8. 三花莼 野荆芥、黄刺泡(陕西),大风寒草、蜂子草(四川),六月寒(天宝本草),金线风(四川),风寒草(四川北部)

Caryopteris terniflora Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 54 (1): 40 1879; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 265. 1890; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 229. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 174. 1932, pro parte excl. syn. *Ocimum aureoglandulosum* Van.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 909. 1936.

8a. 三花莼 图版 22

var. *terniflora*

直立亚灌木,常自基部即分枝,高15—60厘米;茎方形,密生灰白色向下弯曲柔毛。叶片纸质,卵圆形至长卵形,长1.5—4厘米,宽1—3厘米,顶端尖,基部阔楔形至圆形,两面具柔毛和腺点,以背面较密,边缘具规则钝齿,侧脉3—6对;叶柄长0.2—1.5厘米,被柔毛。聚伞花序腋生,花序梗长1—3厘米,通常3花,偶有1或5花,花柄长3—6毫米;苞片细小,锥形;花萼钟状,长8—9毫米,两面有柔毛和腺点,5裂,裂片披针形;花冠紫红色或淡红色,长1.1—1.8厘米,外面疏被柔毛和腺点,顶端5裂,二唇形,裂片全缘,下唇中裂片较大,圆形;雄蕊4枚,与花柱均伸出花冠管外;子房顶端被柔毛,花柱长过雄蕊。蒴果成熟后四瓣裂,果瓣倒卵状舟形,无翅,表面明显凹凸成网纹,密被糙毛。 花果期6—9月。

产河北、山西、陕西、甘肃、江西、湖北、四川、云南。生于海拔550—2600米的山坡、平地或水沟河边。模式标本采自陕西。

全草药用,有解表散寒,宣肺之效。治外感头痛、咳嗽、外障目翳、烫伤等症。

8b. 短梗三花莼 (新拟)

f. *brevipedunculata* P'ei et S. L. Chen in Addenda.

与原变种区别在于花序梗短,长仅0.1—0.3厘米,花柄长0.5—2毫米;花萼长4—5