

表面被粗毛,不明显凹凸成网纹,长约4毫米,淡黄色。 花果期5—9月。

产江苏、安徽、浙江、福建。生阴湿山坡、林边、路旁或水沟边。模式标本采自我国东部。

全草祛暑解表,利尿解毒。治中暑、感冒、尿路感染、白带等症。浙江民间用全草作刀伤药;江苏用全草提制外用止血粉,效果良好。

本种近似三花莼 *C. terniflora* Maxim. 但三花莼腋生有3花,很少为5花;花萼披针形;果瓣倒卵状舟形,表面明显凹凸成网纹,可以区别。

《云南植物志》中的短柄单花莼 *C. nepetaefolia* (Benth.) Maxim. f. *brevipes* C. Y. Wu et H. Li 因仅有武素功 8999 号果实标本,他们亦认为需待有花标本再论证,故本书未引入。

8. 三花莼 野荆芥、黄刺泡(陕西),大风寒草、蜂子草(四川),六月寒(天宝本草),金线风(四川),风寒草(四川北部)

Caryopteris terniflora Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 54 (1): 40 1879; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 265. 1890; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 229. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 174. 1932, pro parte excl. syn. *Ocimum aureoglandulosum* Van.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 909. 1936.

8a. 三花莼 图版 22

var. *terniflora*

直立亚灌木,常自基部即分枝,高15—60厘米;茎方形,密生灰白色向下弯曲柔毛。叶片纸质,卵圆形至长卵形,长1.5—4厘米,宽1—3厘米,顶端尖,基部阔楔形至圆形,两面具柔毛和腺点,以背面较密,边缘具规则钝齿,侧脉3—6对;叶柄长0.2—1.5厘米,被柔毛。聚伞花序腋生,花序梗长1—3厘米,通常3花,偶有1或5花,花柄长3—6毫米;苞片细小,锥形;花萼钟状,长8—9毫米,两面有柔毛和腺点,5裂,裂片披针形;花冠紫红色或淡红色,长1.1—1.8厘米,外面疏被柔毛和腺点,顶端5裂,二唇形,裂片全缘,下唇中裂片较大,圆形;雄蕊4枚,与花柱均伸出花冠管外;子房顶端被柔毛,花柱长过雄蕊。蒴果成熟后四瓣裂,果瓣倒卵状舟形,无翅,表面明显凹凸成网纹,密被糙毛。 花果期6—9月。

产河北、山西、陕西、甘肃、江西、湖北、四川、云南。生于海拔550—2600米的山坡、平地或水沟河边。模式标本采自陕西。

全草药用,有解表散寒,宣肺之效。治外感头痛、咳嗽、外障目翳、烫伤等症。

8b. 短梗三花莼 (新拟)

f. *brevipedunculata* P'ei et S. L. Chen in Addenda.

与原变种区别在于花序梗短,长仅0.1—0.3厘米,花柄长0.5—2毫米;花萼长4—5