

轴被微柔毛;苞片较花梗稍短,小苞片长约 1.5 毫米。花萼钟形,长宽各 5 毫米,外被微柔毛,萼筒长仅 2 毫米,齿 5,呈二唇形,上唇 3 齿,齿卵圆状三角形,几等大,2 侧齿不向中齿靠拢,下唇 2 齿,齿披针形,渐尖。花冠白色,长 8—10 毫米,外被稀疏的微柔毛,冠筒伸出萼外,为萼长的 2 倍以上,冠檐二唇形,上唇 2 裂,裂片卵圆状三角形,直伸,裂片间缺弯不达上唇 1/2,下唇 3 裂,中裂片倒卵状匙形,长为侧裂片的 3 倍,先端有时为波状三钝头,侧裂片卵圆形。雄蕊 4,前对稍长,花药着生于盾状的药隔上。花柱细长。花盘浅杯状,全缘。子房顶端浅裂。小坚果浅栗色,长 2—2.3 毫米,宽 1.5—1.7 毫米。花期 7—8 月。

产甘肃东南部,陕西南部,湖北西部,四川西部,贵州,云南,西藏东南部及台湾;生于亚高山针叶林下,阴湿沃土上,海拔 2000—3000 米。锡金也有。模式标本采自锡金。

3. 动蕊花属——*Kinostemon* Kudo

Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:298.1929, p.p.; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(3):245. 1965, emend.
——*Teucrium* Linn. sect. *Pleurobotrys* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:311. 1890, p.p.

多年生直立草本。叶卵圆形,卵圆状披针形至长圆状线形,具短柄。花具短柄,组成顶生及腋生而轮伞花序仅含 2 花的疏松总状或总状圆锥花序;苞片披针形,有时早落。花萼钟形,10 脉,萼齿 5,呈 3/2 式二唇形,上唇 3 齿,中齿特大,具分明的网状脉,侧齿小,下唇 2 齿。花冠二唇形,上唇 2 裂,下唇 3 裂,中裂片最大。雄蕊 4,自上唇伸出,直伸,前对稍长,超过花冠筒两倍,花丝丝状,药室平叉开,一端连合,花粉粒椭圆形,三沟,外壁具网状雕纹,沟间具三条贯穿两极的加厚带。花柱丝状。花盘盘状,全缘。子房顶端截形,浅 4 裂。小坚果倒卵形,4 枚,背部微见网状雕纹,合生面几达果长 1/2。

2 种 2 变型,分布于我国陕西、四川、湖北、广西、贵州、云南的热带亚热带山地林下。

分 种 检 索 表

1. 植物体无毛,花冠上唇 2 裂片斜三角状卵形……………1. 动蕊花 *K. ornatum* (Hemsl.) Kudo
1. 植物体被平展长达 1.5 毫米的长柔毛,花冠上唇 2 裂片扁圆形……………
……………2. 粉红动蕊花 *K. alborubrum* (Hemsl.) C. Y. Wu et S. Chow