

tax. Sin. **12**(1):23.1974.

苞叶与花等长或略短,绿色或带紫色;花冠筒较长,长(1.5)2—3厘米,上唇2裂片与下唇侧裂片同形。

6. 圆叶筋骨草

Ajuga ovalifolia Bur. et Franch. in Journ. de Bot. **5**:150.1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:194.1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:281.1929; Ward in Gard. Chron. III **95**:326.1934; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob **13**:337.1939.

6 a. 圆叶筋骨草(原变种) 图版 12:1—4

var. *ovalifolia*

一年生草本。茎直立,高10—23厘米,有时达30厘米以上,四棱形,具槽,被白色长柔毛,无分枝。叶柄具狭翅,长0.7—2厘米,绿白色,有时呈紫红色或绿紫色;叶片纸质,长圆状椭圆形至阔卵状椭圆形,长4—8厘米,宽2.2—5厘米,先端钝或圆形,基部楔形,下延,边缘中部以上具波状或不整齐的圆齿,具缘毛,上面黄绿或绿色,脉上有时带紫,满布具节糙伏毛,下面较淡,仅沿脉上被糙伏毛,侧脉4—5对,与中脉在上面平坦,下面隆起。穗状聚伞花序顶生,几呈头状,长2—3厘米,由3—4轮伞花序组成;苞叶大,叶状,卵形或椭圆形,长1.5—4.5厘米,下部者呈紫绿色、紫红色至紫蓝色,具圆齿或全缘,被缘毛,上面被糙伏毛,下面几无毛;花梗短或几无。花萼管状钟形,长5—8毫米,无毛但仅萼齿边缘被长缘毛,具10脉,萼齿5,长三角形或线状披针形,长占花萼之半或较短。花冠红紫色至蓝色,筒状,微弯,长2—2.5厘米或更长,外面被疏柔毛,内面近基部有毛环,冠檐二唇形,上唇2裂,裂片圆形,相等,下唇3裂,中裂片略大,扇形,侧裂片圆形。雄蕊4,二强,内藏,着生于上唇下方的冠筒喉部,花丝粗壮,无毛。花柱被极疏的微柔毛或无毛,先端2浅裂,裂片细尖。花盘环状,前面呈指状膨大。花期6—8月,果期8月以后。

产四川西部,甘肃西南部;生于草坡或灌丛中,海拔2800—3700米。模式标本采自四川康定。

6 b. 美花变种 图版 12:5—6

var. *calantha* (Diels) G. Y. Wu et G. Chen in Act. Phytotax. Sin. **12**(1): 23, pl. 8, f. 5—6. 1974——*Ajuga calantha* Diels in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**:475. 1922; Rehd. et Kobuski in Journ. Arn. Arb. **14**:30.1933; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:72.1934, Symb. Sin. **7**:912.1936.