

少被柔毛,叶略厚,近纸质,长3.5—5.5厘米,宽1.5—2.3厘米,花序短,由4—5个轮伞花序组成,每个轮伞花序具4—6花,花白色,少。产四川东部,生于草坡上,海拔约2000米,模式标本采自四川巫溪。

### 8. 多花筋骨草

**Ajuga multiflora** Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang. **2**: 125. 1833; Komarov in Act. Hort. Petrop. **22**:335. 1903—04; Nakai in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **31**:157. 1911, et in Bot. Mag. Tokyo **35**:170. 1921; Kudo in Mém. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:282. 1929; Komarov et Klof. -Alisova, Key Pl. Far. East. USSR **2**:t. 270. 1932; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 375. 1939; Pissjauk. in Fl. URSS **20**:36.1954; 刘慎谔等, 东北植物检索表 312. pl. 104, f. 2. 1959——*Ajuga amurica* Freyn in Oesterr. Bot. Zeit. 408. 1902——*Ajuga lanosa* Sun in 科学社生物所论文集 **7**:14, f. 1. 1932, *syn. nov. e typo*——*Ajuga genevensis* auct. non Linn.: Benth. in DC. Prodr. **12**:596. 1848, quoad pl. Ghin.: Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang. **9**:221. 1859, Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**:815. 1883, et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **29**:185. 1883; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II. **5**:245. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:315. 1890, p. p., quoad pl. Chihli.

#### 8 a. 多花筋骨草(原变种)

##### var. **multiflora**

多年生草本。茎直立,不分枝,高6—20厘米,四棱形,密被灰白色绵毛状长柔毛,幼嫩部分尤密。基生叶具柄,柄长0.7—2厘米,茎上部叶无柄;叶片均纸质,椭圆状长圆形或椭圆状卵圆形,长1.5—4厘米,宽1—1.5厘米,先端钝或微急尖,基部楔状下延,抱茎,边缘有不甚明显的波状齿或波状圆齿,具长柔毛状缘毛,上面密被下面疏被柔毛状糙伏毛,脉3或5出,两面突起。轮伞花序自茎中部向上渐靠近,至顶端呈一密集的穗状聚伞花序;苞叶大,下部者与茎叶同形,向上渐小,呈披针形或卵形,渐变为全缘;花梗极短,被柔毛。花萼宽钟形,长5—7毫米,外面被绵毛状长柔毛,以萼齿上毛最密,内面无毛,萼齿5,整齐,钻状三角形,长为花萼的2/3,先端锐尖,具柔毛状缘毛。花冠蓝紫色或蓝色,筒状,长1—1.2厘米,内外两面被微柔毛,内面近基部有毛环,冠檐二唇形,上唇短,直立,先端2裂,裂片圆形,下唇伸长,宽大,3裂,中裂片扇形,侧裂片长圆形。雄蕊4,二强,伸出,微弯,花丝粗壮,具长柔毛。花柱细长,微弯,超出雄蕊,上部被疏柔毛,先端2浅裂,裂片细尖。花盘环状,裂片不明显,