

前面呈指状膨大。子房顶端被微柔毛。小坚果倒卵状三棱形,背部具网状皱纹,腹部中间隆起,具1大果脐,其长度占腹面2/3,边缘被微柔毛。花期4—5月,果期5—6月。

产内蒙古,黑龙江,辽宁,河北,江苏,安徽;生于开朗的山坡疏草丛或河边草地或灌丛中。苏联远东地区,朝鲜也有。模式标本采自北京昌平。

朝鲜用全草入药,作利尿药,名为花夏枯草。

8 b. 莲座变种

var. *serotina* Kitagawa, Lineam, Fl. Mansh. 375, Tab. IX. 1939.

这一变种与原变种不同在于植株较粗壮,高13—23厘米;茎基部叶常作莲座状,卵状长圆形,上部的叶及苞叶常为宽卵形或几圆形,边缘具粗锯齿;花长达18毫米。

产黑龙江中部,辽宁南部。模式标本采自黑龙江中部。

8 c. 短穗变种

var. *brevispicata* G. Y. Wu et G. Chen in Act. Phytotax. Sin. 12(1):26. 1974.

这一变种与原变种不同在于植株高约12厘米;茎及花序密被长绢毛;花序短而密,长3—4厘米;在花序下方的叶常互生,披针形或长圆状披针形,具长柄;苞叶较小,披针形,被长绢毛。

产辽宁。模式标本采自辽宁千山。

9. 康定筋骨草

Ajuga campylanthoides G. Y. Wu et G. Chen in Act. Phytotax. Sin. 12(1):26, pl. 8, f. 13—16. 1974 — *Ajuga ciliata* auct. non Bunge: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:194. 1915, p. p. min. quoad Wilson Veitch Exp. 4325 — *Ajuga campylantha* auct. non Diels: Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob 13:337. 1939.

9 a. 康定筋骨草(原变种) 图版 12:13—16

var. *campylanthoides*

多年生草本,直立或具匍匐茎,高(5)8—18厘米。茎四棱形,基部近木质化,通常无分枝,被具节的白色长柔毛。叶柄长4—7毫米,具槽及狭翅;叶片坚纸质,卵形或披针状长圆形,长2.5—4厘米,宽1—2(3)厘米,先端圆形或极钝,基部楔状下延,边缘具波状粗齿,有时在茎上部者几为全缘,两面被疏糙伏毛,下面以脉上为多,边缘具缘毛。轮伞花序在茎上部排列成顶生长1—3厘米的穗状轮伞花序,稀在茎中部以