

毛,边缘具缺刻及缘毛;苞片及小苞片匙形,长2—8毫米,宽1—2.5毫米,无柄,疏被柔毛,近全缘;花梗短,长约1毫米,被柔毛。花萼钟形,长4.5—6毫米,外面被长柔毛,在齿上尤为密集,内面无毛,具10脉,萼齿5,钻状三角形,整齐,长为花萼的1/2或略长,先端锐尖,具长柔毛状缘毛。花冠紫色或淡紫色,有深紫色斑点,筒状,略超出花萼,外面被微柔毛及淡色腺点,内面近基部具毛环,冠檐二唇形,上唇短,直立,顶端微凹,下唇宽大,伸长,3裂,中裂片倒心形,侧裂片长圆形。雄蕊4,二强,略超出花冠,花丝粗壮,挺直,具长柔毛,花药与花丝相接处有时具白色小突起。花柱粗壮,无毛,超出雄蕊,先端2浅裂,裂片细尖。花盘环状,裂片不明显,前面呈指状膨大。子房4裂,无毛。小坚果椭圆状或椭圆倒卵状三棱形,背部具网状皱纹,腹部中间隆起,具果脐,果脐占腹面2/3或更多。花期4—6月,果期5—6月或稍晚。

产云南中部、中南部及西部,四川西南部;生于开阔山坡的稀疏矮草丛、略肥沃土上,海拔1500—1900米。阿富汗,印度,尼泊尔及缅甸也有。模式标本采自尼泊尔。

云南嵩明用根入药,用于止血消炎。

13. 散瘀草(云南曲靖) 山苦草、苦草、胆草(云南曲靖),散血草(云南曲靖、昭通)

Ajuga pantantha Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:911, t. 13, f. 11. 1936.

多年生草本,平展上升或具匍匐茎,从根部生出单茎或多茎。茎基部通常无叶,长7—32厘米,细弱,略呈四棱形,密被灰白色长柔毛或绵状长柔毛。叶柄长5毫米或几无,具槽及狭翅,被长柔毛;叶片坚纸质,干时黑色,下面常带红色,长圆状倒卵形或倒三角状卵形,长1.5—3厘米,宽0.8—1.8厘米,先端钝,或几圆形,或呈3钝尖,基部楔形,下延,边缘具不整齐疏齿或几全缘,具缘毛,两面被疏柔毛,尤以下面脉上为多,侧脉少数,与中脉在下面明显。轮伞花序具4—8花,着生于几乎全部叶腋内;花梗无或几无。花萼紫色,漏斗状,长5—7毫米,外面被长柔毛,内面无毛,具10脉,萼齿5,披针形或披针状三角形,长为花萼之半或较长,等大,被长柔毛状缘毛。花冠玫瑰红、淡紫、紫红或紫蓝色,筒状,挺直,基部微呈曲膝状,长0.8—1厘米,外面被疏柔毛及疏微柔毛,有淡色腺点,内面近基部有毛环,其余部分无毛或几无毛,冠檐二唇形,上唇短,直立,圆形,先端微缺,下唇宽大,伸长,中裂片倒卵圆形,先端微缺,侧裂片长圆形。雄蕊4,二强,仅前对微伸出,花丝粗壮,通常无毛或被疏微柔毛。花柱细弱,微弯,无毛,超出雄蕊,先端2浅裂,裂片细尖。花盘环状,裂片不明显。子房4裂,无毛。小坚果长圆状三棱形,褐色,背部具网状皱纹,腹部有1果脐,果脐约占腹面1/2。花期8—11月,果期10月左右。

产云南东部、东北部；生于干燥荒坡矮草丛中，海拔 2400—2700 米。模式标本采自云南会泽。

云南用全草入药，曲靖地区内服治慢性肝炎、尿路感染、口腔炎，外敷疮疡肿毒，昭通地区用于骨折配方。

14. **金疮小草** (湖南) 青鱼胆草、青鱼胆、苦地胆、散血草 (湖南)

Ajuga decumbens Thunb. Fl. Jap. 243.1784; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 697.1835, et in DG Prodr. 12:598.1848; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 11:820.1883, et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29:188.1884; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:288.1929; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:315.1890, p. p.; Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29:550.1900; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:193.1915, p. p.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:910.1936, p. p.; Ohwi, Fl. Jap. 799. 1956——*Ajuga genevensis* auct. non Linn.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:315.1890, p. p., excl. syn. et spec. Hopeh (Chihli.), Liaoning. (Shingking.)——*Ajuga remota* auct. non Benth.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:195.1915, p. p., quoad spec. Mengtze.

14a. **金疮小草** (原变种) 图版 13:5

var. **decumbens**

一或二年生草本，平卧或上升，具匍匐茎，茎长 10—20 厘米，被白色长柔毛或绵状长柔毛，幼嫩部分尤多，绿色，老茎有时呈紫绿色。基生叶较多，较茎生叶长而大，叶柄长 1—2.5 厘米或以上，具狭翅，呈紫绿色或浅绿色，被长柔毛；叶片薄纸质，匙形或倒卵状披针形，长 3—6 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，有时长达 14 厘米，宽达 5 厘米，先端钝至圆形，基部渐狭，下延，边缘具不整齐的波状圆齿或几全缘，具缘毛，两面被疏糙伏毛或疏柔毛，尤以脉上为密，侧脉 4—5 对，斜上升，与中脉在上面微隆起，下面十分突起。轮伞花序多花，排列成间断长 7—12 厘米的穗状花序，位于下部的轮伞花序疏离，上部者密集；下部苞叶与茎叶同形，匙形，上部者呈苞片状，披针形；花梗短。花萼漏斗状，长 5—8 毫米，外面仅萼齿及其边缘被疏柔毛，内面无毛，具 10 脉，萼齿 5，狭三角形或短三角形，长约为花萼 1/2。花冠淡蓝色或淡红紫色，稀白色，筒状，挺直，基部略膨大，长 8—10 毫米，外面被疏柔毛，内面仅冠筒被疏微柔毛，近基部有毛环，冠檐二唇形，上唇短，直立，圆形，顶端微缺，下唇宽大，伸长，3 裂，中裂片狭扇形或倒心形，侧裂片长圆形或近椭圆形。雄蕊 4，二强，微弯，伸出，花丝细弱，被疏柔毛或几无毛。花柱超出雄蕊，微弯，先端 2 浅裂，裂片细尖。花盘环状，裂片不明显，前