

产云南东部、东北部；生于干燥荒坡矮草丛中，海拔 2400—2700 米。模式标本采自云南会泽。

云南用全草入药，曲靖地区内服治慢性肝炎、尿路感染、口腔炎，外敷疮疡肿毒，昭通地区用于骨折配方。

14. **金疮小草** (湖南) 青鱼胆草、青鱼胆、苦地胆、散血草 (湖南)

Ajuga decumbens Thunb. Fl. Jap. 243.1784; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 697.1835, et in DG Prodr. 12:598.1848; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 11:820.1883, et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29:188.1884; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:288.1929; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:315.1890, p. p.; Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29:550.1900; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:193.1915, p. p.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:910.1936, p. p.; Ohwi, Fl. Jap. 799. 1956——*Ajuga genevensis* auct. non Linn.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:315.1890, p. p., excl. syn. et spec. Hopeh (Chihli.), Liaoning. (Shingking.)——*Ajuga remota* auct. non Benth.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:195.1915, p. p., quoad spec. Mengtze.

14a. **金疮小草** (原变种) 图版 13:5

var. **decumbens**

一或二年生草本，平卧或上升，具匍匐茎，茎长 10—20 厘米，被白色长柔毛或绵状长柔毛，幼嫩部分尤多，绿色，老茎有时呈紫绿色。基生叶较多，较茎生叶长而大，叶柄长 1—2.5 厘米或以上，具狭翅，呈紫绿色或浅绿色，被长柔毛；叶片薄纸质，匙形或倒卵状披针形，长 3—6 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，有时长达 14 厘米，宽达 5 厘米，先端钝至圆形，基部渐狭，下延，边缘具不整齐的波状圆齿或几全缘，具缘毛，两面被疏糙伏毛或疏柔毛，尤以脉上为密，侧脉 4—5 对，斜上升，与中脉在上面微隆起，下面十分突起。轮伞花序多花，排列成间断长 7—12 厘米的穗状花序，位于下部的轮伞花序疏离，上部者密集；下部苞叶与茎叶同形，匙形，上部者呈苞片状，披针形；花梗短。花萼漏斗状，长 5—8 毫米，外面仅萼齿及其边缘被疏柔毛，内面无毛，具 10 脉，萼齿 5，狭三角形或短三角形，长约为花萼 1/2。花冠淡蓝色或淡红紫色，稀白色，筒状，挺直，基部略膨大，长 8—10 毫米，外面被疏柔毛，内面仅冠筒被疏微柔毛，近基部有毛环，冠檐二唇形，上唇短，直立，圆形，顶端微缺，下唇宽大，伸长，3 裂，中裂片狭扇形或倒心形，侧裂片长圆形或近椭圆形。雄蕊 4，二强，微弯，伸出，花丝细弱，被疏柔毛或几无毛。花柱超出雄蕊，微弯，先端 2 浅裂，裂片细尖。花盘环状，裂片不明显，前