

面微呈指状膨大。子房4裂,无毛。小坚果倒卵状三棱形,背部具网状皱纹,腹部有果脐,果脐约占腹面2/3。花期3—7月,果期5—11月。

产长江以南各省区,最西可达云南西畴及蒙自;生于溪边、路旁及湿润的草坡上,海拔360—1400米。朝鲜,日本也有。模式标本采自日本。

全草入药,治痈疽疔疮、火眼、乳痈、鼻衄、咽喉炎、肠胃炎、急性结膜炎、烫伤、狗咬伤、毒蛇咬伤以及外伤出血等症。

14 b. 狭叶变种

var. **oblancifolia** Sun ex G. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. **11**(1):35. 1966
——*Ajuga genevensis* auct. non Linn.: 孙雄才,科学社生物所论文集 **7**:229. 1932.

这一变种与原变种不同在于叶均倒披针形至几长圆形,边缘通常具不规则的牙齿;茎直立,稀匍匐状,高或长可达20—30厘米;花冠白色或白绿色,长1.5—2厘米。

产贵州北部,四川南部;生于竹林内湿润地或路旁,海拔1500—2300米。模式标本采自四川南川金佛山。

15. **紫背金盘**(植物名实图考) 破血丹、石灰菜、散血草、退血草、筋骨草(中国药用植物图鉴,第二册),见血青、白头翁(江西),白毛夏枯草(浙江、江苏)

Ajuga nipponensis Makino in Bot. Mag. Tokyo **23**:67. 1909, Ill. Fl. Jap. **2**:(198). 1924; Matsum. Ind. Fl. Jap. **2**:526. 1912; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:289. 1929; Ohwi, Fl. Jap. 996. 1956——*Ajuga argyi* Lévl. ex Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:194. 1915, pro syn.——*Ajuga matsumurana* Kudo in Journ. Soc. Trop. Agr. **3**:225. 1931; Mori in Masam. Short Fl. Formos. 182. 1936——*A. pallescens* Price et Metcalf in Lingn. Sci. Journ. **13**:135. 1934, non est *A. genevensis* Linn. var. *pallescens* Maxim., p. p.——*Ajuga genevensis* auct. non Linn.: Benth. in DC. Prodr. **12**:596. 1848, quoad pl. a Fortune lect.; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**:815. 1883, quoad pl. a Fortune lect., et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **29**:185. 1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:315. 1890, quoad pl. Fortune. et Hance.; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **22**:319. 1906; Matsuda in Bot. Mag. Tokyo **25**:

图版 13: 1. 九味一枝蒿 *Ajuga bracteosa* Wall ex Benth. 1. 植株一部分, 示花枝。2—4. 痢止蒿 *Ajuga forrestii* Diels. 2. 植株一部分, 示花枝; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊。5. 金疮小草(原变种) *Ajuga decumbens* Thunb var *decumbens*, 5. 植株一部分, 示花枝。(曾孝濂绘)

95.1911, **26**:134, 342.1912, **27**:274.1913; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:195.1915; Diels in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**:475.1922; 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**:13.1932——*Ajuga genevensis* Linn. var. *pallescens* auct. non Maxim.: Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**:550.1900; Matsuda in Bot. Mag. Tokyo **20**:(142).1906——*Ajuga decumbens* auct. non Thunb.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:315.1890; Dunn et Tutchner in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:212.1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:193.1915, p. p.; 孙雄才, 科学社生物所论文集 **10**:52.1935 et auct. plur.——*Ajuga remota* auct. non Benth.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:195.1915, p. p.——*Ajuga labordei* auct. non Vaniot: Migo in Journ. Jap. Bot. **14**:283.1938.

15a. **紫背金盘**(原变种) 图版 14:1—2

var. **nipponensis**

一或二年生草本。茎通常直立,柔软,稀平卧,通常从基部分枝,高 10—20 厘米或以上,被长柔毛或疏柔毛,四棱形,基部常带紫色。基生叶无或少数;茎生叶均具柄,柄长 1—1.5 厘米,基生者若存在则较长,可达 2.5 厘米,具狭翅,有时呈紫绿色,叶片纸质,阔椭圆形或卵状椭圆形,长 2—4.5 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,先端钝,基部楔形,下延,边缘具不整齐的波状圆齿,有时几呈圆齿,具缘毛,两面被疏糙伏毛或疏柔毛,下部茎叶背面且常带紫色,侧脉 4—5 对,与中脉在上面微隆起,下面突起。轮伞花序多花,生于茎中部以上,向上渐密集组成顶生穗状花序;苞叶下部者与茎叶同形,向上渐变小呈苞片状,卵形至阔披针形,长 0.8—1.5 厘米,绿色,有时呈紫绿色,全缘或具缺刻,具缘毛;花梗短或几无。花萼钟形,长 3—5 毫米,外面仅上部及齿缘被长柔毛,内面无毛,具 10 脉,萼齿 5,狭三角形或三角形,长为花萼之半,近整齐,先端渐尖。花冠淡蓝色或蓝紫色,稀为白色或白绿色,具深色条纹,筒状,长 8—11 毫米或略短,基部略膨大,外面疏被短柔毛,内面无毛,近基部有毛环,冠檐二唇形,上唇短,直立,2 裂或微缺,下唇伸长,3 裂,中裂片扇形,先端平截或微缺,侧裂片狭长圆形,中部略宽,先端急尖。雄蕊 4,二强,伸出,花丝粗壮,直立或微弯,无毛。花柱细弱,超出雄蕊,先端 2 浅裂,裂片细尖。花盘环状,裂片不甚明显。子房无毛。小坚果卵状三棱形,背部具网状皱纹,腹面果脐达果轴 3/5。花期在我国东部为 4—6 月,西南部为 12 月至翌年 3 月,果期前者为 5—7 月,后者为 1—5 月。

产我国东部、南部及西南各省区,西北至秦岭南坡,河北有记录,但未见标本;生于田边、矮草地湿润处、林内及向阳坡地,适应性很强,海拔 100—2300 米。日本,朝