

鲜也有。模式标本采自日本。

全草入药,煎水内服治肺脓疡、肺炎、扁桃腺炎、咽喉炎、气管炎、腮腺炎、急性胆囊炎、肝炎、痔疮肿痛、鼻衄、牙痛、目赤肿痛、黄疸病、便血、白尿、血瘀肿痛、产后瘀血、妇女血气痛等症,有镇痛散血之功效。外用治金疮、刀伤、外伤出血、跌打扭伤、骨折、痈肿疮疖、狂犬咬伤等症。兽用治牛马肚痛发水。

15b. 矮生变种

var. **pallescent** (Maxim.) G. Y. Wu et G. Chen in Act. phytotax. Sin **12** (1):28. 1974——*Ajuga genevensis* Linn. var. *pallescent* Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**:816. 1883, p. p., et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **29**:185. 1884——*Ajuga labordei* Vaniot in Bull. Acad. Internat. Géogr. Bot **14**:185. 1904, *syn. nov.* e descr.——*Ajuga decumbens* Thunb. var. *pallescent* (Maxim.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:72. 1934, Symb. Sin **7**:911. 1936——*Ajuga decumbens* auct. non Thunb.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:244. 1912, p. p.——*Ajuga remota* auct. non Benth.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:244. 1912; Dunn in ibid. **6**:195. 1915, p. p. min.

这一变种与原变种不同在于植株矮小,细弱,被密柔毛,从基部分枝,上升,稀具匍匐茎,高8—10厘米或以上;叶较小,倒卵形、近圆形或匙形,边缘具粗齿或为不整齐的波状齿;花萼长3—4毫米;花冠白色或淡蓝色,有时呈紫色,长6—8毫米。

产江苏,浙江,安徽,福建,台湾,江西,湖南,广东,广西,云南,四川,陕西;生于疏草坡上、路旁及干旱河边,海拔1350—3300米。等模式标本采自我国江西九江、广东的广州以及日本中部。

以上二变种之间在体型上有中间类型,不易划断,同时本种与金疮小草的各类型,亦有相连之处。按这种情况看来,这两种似有合并的必要,但在牧野(Makino, T.)的《日本植物图鉴》,工藤祐舜(Kudo, Y.)以及最近的一些日本植物分类学家们[如大井次三郎(Ohwi, 1956)的《大日本植物志》]等的著作中,仍作两种处理,由于我们掌握的日本材料不多,因此,对这两种处理没作太大的变动,仍待继续深入研究。

16. 网果筋骨草

Ajuga dictyocarpa Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:84. 1914; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:248. 1929; Murata in Act. Phytotax. Geobot. **25**:53. 1972——*Ajuga macrosperma* Wall. ex Benth. sensu Doan in Lect. Gen. Fl. Indo-Chine **4**:1044. 1936, p. p.

草本，有时具匍匐茎，上升，上升部分长 20—30 厘米。茎被短柔毛，四棱形，通常在上部分枝。叶柄具狭翅，长 1—3 厘米；叶片膜质，倒卵形或长圆状倒卵形，稀三角状倒卵形，长 3—4 厘米，宽 2 厘米，有时长达 10 厘米，宽达 5 厘米，先端极钝或几圆形，基部楔形或下延，边缘通常在中部以上具粗钝齿或不整齐的圆齿或裂片，近基部全缘，具疏缘毛，两面无毛，中脉被短柔毛，下面中脉隆起。轮伞花序约具 12 花或以上，向上愈密集排列成顶生长 5—12 厘米的穗状花序；苞叶在下部者与茎叶同形，但变小，向上呈苞片状，卵形至卵状披针形，具齿或全缘，最小者长约 8 毫米，宽约 4 毫米；花梗极短或几无。花萼钟状，长 3.5—4.5 毫米，宽 3—3.5 毫米，外面通常仅在齿上被疏长柔毛，内面无毛，萼齿 5，卵状三角形，长为花萼之半，具缘毛。花冠白色，筒状，直立，基部前面微呈膝状，长 6—8 毫米，除内面近基部有毛环及冠檐外面多少被柔毛外，其余内外两面均无毛，冠檐二唇形，上唇短，半圆形，2 裂，下唇延伸，3 裂，中裂片狭心形，长约 2 毫米，宽约 1.5 毫米，顶端微缺，侧裂片长圆形，长约 1.5 毫米，宽约 1 毫米。雄蕊 4，二强，着生于冠筒上部，伸出，花丝细，挺直，中部略被疏微柔毛，花药肾形，1 室。花柱直，微外露，无毛，先端 2 浅裂，裂片细尖。花盘环状，裂片几相等且不明显，前面呈指状膨大。子房 4 裂，无毛。小坚果倒卵状三棱形，背部具网状皱纹，腹部具果脐，果脐大，占腹面 2/3。花、果期 3—6 月。

产台湾，福建，江西及广东（沿海岛屿）；生于潮湿的水边草地上。越南及日本（琉球群岛）也有。模式标本采自我国台湾。

17. 大籽筋骨草 散血草（贵州瓮安）

Ajuga macrosperma Wall. ex Benth in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:58.1830, Labiat. Gen. et Sp. 697.1836, et in DC. Prodr. 12:599.1848; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 11:823.1883, et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29:190.1884; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4:704.1885; Briq. in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. 4, 3a:210.1897; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:193.1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:290.1929; Doan in Lect. Gen. Fl. Indo-Chine 4:1044.1936, p. p. — *Ajuga genevensis* Linn. var. *pallenscens* auct. non Maxim.; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22:319.1906 — *Ajuga genvensis* auct. non Linn.; Hayata, Icon. Pl. Formos. 8:84.1914.

17 a. 大籽筋骨草（原变种）图版 14: 4—5

var. *macrosperma*

草本，直立，有时具匍匐茎，高 15—40 厘米或稍高。茎四棱形，有槽，被疏柔毛或