

产福建,江西,湖南,广东,广西,四川;生于山谷溪旁,石灰岩上,河边林下,疏林中,石边,海拔约700米。模式标本采自湖南西部新化、武岗一带。

广西贵县用全草入药,有活血通经之效,单用水煎或同猪肉蒸内服,治妇女闭经。

2b. **长叶变种** 牛奶藤(云南绥江),四轮筋骨草,万年青(四川宜宾)

var. **oblongifolia** C. Y. Wu et C. Chen in Act. Phytotax. Sin. **9**(1):11. 1964.

这一变种与原变种不同在于叶较大,长圆形,长4—5厘米,宽1.5—2厘米,叶柄长18—23毫米。

产四川南部,云南东北部;生于林下。模式标本采自四川宜宾。

7. 歧伞花属——*Cymaria* Benth.

Benth. in Bot. Reg. **15**:sub t. 1292.1829.

直立灌木。茎多分枝,枝钝四棱形,纤弱,密被蜷曲平伏毛。叶具柄,柄多少具狭翅,叶片卵形或卵状菱形,边缘具齿。聚伞花序腋生,二歧状,有时再分歧,最后分枝蝎尾状,疏花,具梗;苞片锥形,线形至倒披针形,宿存,极小。花萼直伸,花时钟形,具10脉,不明显,萼齿5,等大,三角形,锐尖,果时花萼稍膨大,近于壶形,脉纹明显。花冠白色,小,冠筒圆筒形,直伸,稍伸出于萼,内面在喉部下方于花丝着生处有须状硬毛束,因而形成间断不明显的毛环,冠檐二唇形,上唇直伸,微内凹,全缘,下唇宽大,开展,3裂,中裂片最大。雄蕊4,前对稍长,均自上唇片下上升,花丝丝状,花药2室,室叉开。花柱丝状,先端不相等2浅裂。花盘平顶。子房顶端被毛,微4裂。小坚果倒卵状,有明显粗糙窝孔,合生面侧生而大。

约3种,极相近,自缅甸,越南,经我国广东海南,至马来西亚,印度尼西亚(爪哇)及菲律宾。我国有2种,产于广东海南。

分 种 检 索 表

1. 叶柄长2—3.5(4)厘米,具明显渐狭的翅;果萼径约1.5毫米 1. **长柄歧伞花** *C. acuminata* Decne
 1. 叶柄长0.5—2厘米,不明显具翅;果萼略大,径约2毫米 2. **歧伞花** *C. dichotoma* Benth

1. 长柄歧伞花

Cymaria acuminata Decne. in Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris **3**:71. 1834; Benth. in DC. Prodr. **12**:602. 1848, Miq. Fl. Ind. Bat. **2**:992. 1859;