

片卵形或卵状菱形，茎中部者长4—8厘米，宽2—4.5厘米，先端渐尖，基部楔形，基部以上有具小突尖的浅粗齿，膜质，上面暗绿色，疏生细刚毛，下面淡绿色，沿脉上密生余部稍疏生平伏毛，并密布橙黄色腺点。聚伞花序腋生，二歧状，有时再分歧成四歧状，疏花，具长1.5—2厘米的总梗；花梗短，长约1毫米，总梗、花梗与序轴均密被平伏毛；苞片倒披针形，线形至锥形，宿存，极小。花萼宽钟形，长约1.5毫米，外被微柔毛，散布橙黄色腺点，内面在上部被长柔毛，下部无毛，脉10，不明显，萼齿5，三角形，锐尖，具微尖头，果时花萼膨大，壶形，径约2毫米，脉纹明显。花冠白色，长3毫米，外面被微柔毛，夹有腺点，冠筒长2毫米，圆筒形，直伸，内面在喉部下方于花丝着生处有须状硬毛束，因而形成间断不明显的毛环，冠檐二唇形，上唇椭圆形，微内凹，下唇宽大，开展，3裂，裂片均椭圆形，中裂片稍大。雄蕊4，前对稍长，均自上唇片上升，仅前对微露出，花丝丝状，微具髯毛。花柱丝状，先端不相等2浅裂。小坚果卵状，具明显粗糙窝孔，顶端微被毛及腺点，合生面侧生而大。花期7月，果期8—10月。

产广东海南；生于干燥疏林下，海拔约30米。缅甸，马来西亚也有。模式标本采自缅甸。

8. 宽管花属——*Eurysolen* Prain

Prain in Sci. Mem. Medic. Offic. Ind. Army Calcutta 11:

43. 1898.

小灌木，枝条有时柔弱上升，被毛。叶具长柄，纸质，边缘有齿缺。穗状花序顶生于短枝上，圆柱状，柔弱，由紧密的轮伞花序所组成；苞片小，宿存，具缘毛。花萼管状钟形，明显具10脉，萼齿5，前2齿稍长，近等大，果时花萼稍成壶形，齿直立。花冠筒伸出，前面中部囊状膨大，内面具毛环，冠檐二唇形，上唇直立，稍凹，下唇较长，平展，3裂，中裂片最长，近圆形，侧裂片小，半圆形。雄蕊4，上升，稍伸出花冠外，芽时内卷，花药1室，纵裂。花柱丝状，先端相等2浅裂，裂片略叉开。花盘近环状，裂片极浅，相等。子房4裂，具半透明的粉囊状小突起。小坚果扁倒卵形，黑褐色，背部具细皱纹，腹部具长硬毛及腺状小突起。

单种属，分布印度，缅甸至马来西亚。我国产云南西南部、南部及东南部。

图版 16: 歧伞花 *Cymaria dichotoma* Benth. 1. 木质化的植株下部及根； 2. 侧生花枝； 3. 侧生果枝； 4. 茎上毛被； 5. 花，侧面观； 6. 花冠纵剖，内面观，兼示雄蕊； 7. 雌蕊； 8. 花萼纵剖，内面观； 9. 花萼内面上部毛被； 10. 花萼外面毛被； 11. 第一花小苞片； 12. 果萼形状； 13. 小坚果，腹面观； 14. 小坚果，侧面观。（王利生绘）