

Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:252. 1929—*Scutellaria* § 2. *Racemosae floribus sparsis* Benth. in Bot. Reg. **18**: ad calc. n. 1493. 1832—*Scutellaria* Linn. Sect. 2. *Euscutellaria* Briq. Ser. 2. *Heteranthesia* Briq. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:226. 1896.

花组成顶生背腹向的总状花序,特别在上部者互生;苞片细小,草质。

1. **异色黄芩** 挖耳草、一支箭、紫背草(云南思茅、红河),熊胆草(云南临沧),夜(野)行草(云南路西),四天红、追天花根(广西隆林),土黄芩(贵州兴义)

Scutellaria discolor Wall. ex Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830, Labiat. Gen. et Sp. 428. 1834, et in DC. Prodr. **12**:417. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:667. 1885; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:492. 1911, et in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:175. 1915, p. p.; Ridley, Fl. Malay Penins. **2**:649. 1923; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:253. 1929; Doan in Léc. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:1000. 1936; Back. et Bakh. f. Fl. Java **2**:620. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:165. 1969—*Scutellaria salvia* Lévl. in Bull. Géogr. Bot. **24**:252. 1914.

1 a. **异色黄芩**(原变种) 图版 27

var. **discolor**

多年生草本;根茎匍匐,节上密生纤维状须根。茎上升或直立,连花序高5.5—38厘米,粗0.8—2毫米,四棱形,具槽,密被微柔毛,通常带红色,不分枝或间有花序分叉,近基部具叶且多少木质化,上部无叶。茎叶通常2—4对,罕有6—7对,密集于茎基部如基生叶状,或彼此远离,相隔1.6—3.5厘米,叶片坚纸质,椭圆形,卵圆形或宽椭圆形,长1.5—7.4厘米,宽1—4.8厘米,先端浑圆或钝,基部心形或浅心形,边缘具波状圆齿,上面绿色,密被极细的微柔毛间杂有短柔毛,下面绿色或常带紫色,有时灰绿色,被短柔毛,尤以脉上者为甚,侧脉4—5对,与中脉均上面略凹陷下面突出,在叶缘的内方网结,叶柄长0.5—2.2厘米,有时达4.8厘米,扁平,密被短柔毛;苞叶细小,草质,卵圆形至椭圆形,长0.7—2.5厘米,宽0.5—1.5厘米,先端钝,基部圆状截形,无柄或具短柄。花互生或少数在花序下部者对生,组成背腹向的总状花序或因花序分叉而多少呈圆锥状,花序长5—24厘米,花葶状;苞片小,狭卵圆形或卵圆形,长1.5—3毫米,宽约1毫米,全缘,被短柔毛;总梗长2.5—4厘米,与序轴均密被微柔毛;花梗长2.5—3毫米,通常带紫色,密被短柔毛。花萼长约2毫米,外被短柔毛及具腺短柔毛,内面无毛,盾片开张,半圆形,高0.5—0.8毫米,被短柔毛,果时增大,盾