

var. **pubescens** G. Y. Wu et H. W. Li, 海南植物志 4:34.1976.

这一变种与原变种不同在于茎、叶(尤其是叶背)密被短柔毛。

产广东海南及广西。模式标本采自广东海南儋县。

5. 缙云黄芩 图版 29

Scutellaria tsinyunensis G. Y. Wu et S. Chow in Addenda 577.1977. —

Scutellaria yunnanensis Lévl. var. *subsessilifolia* Sun ex G. H. Hu in Act. phytotax. Sin. 11(1):43. 1966 — *Scutellaria formosana* auct. non N. E. Brown: Hand.-Mazz. ex Hao in Engler, Bot. Jahrb. 68:634. 1938

多年生草本;根茎匍匐,在节上生纤维状根。茎直立,高 30—60 厘米,四棱形,在棱上微具翅,沿棱上被向上的短柔毛余部近无毛,常呈暗紫色,不分枝或少分枝。叶自茎基部向上增大,茎下部者细小,圆形至卵圆形,长常不及 1 厘米,先端急尖,基部浅心形,茎中部以上者卵圆状披针形至披针形,最上部者最大,长 4—8 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端尾尖至尾状渐尖,基部圆形至浅心形,均边缘具远离波状具胼胝体的小牙齿,坚纸质,上面绿色,下面较淡或微带紫色,两面除沿中脉及侧脉上被极细的短柔毛外余均无毛,侧脉 3 对,与中脉在上面多少明显下面突出;叶柄近无或极短,长 0—4 毫米,腹凹背凸,被短柔毛。花对生,组成顶生一侧向长 8—10 厘米的总状花序;总梗长 2—3 厘米;花梗长 3 毫米,下部 1/3 有一线形长不及 1 毫米的小苞片,与序轴密被短柔毛及具腺有节的微柔毛;苞片狭披针形,长 1—1.5 毫米,无柄,无毛,早落。花萼长 2.5 毫米,外密被短柔毛及具腺有节的微柔毛,盾片平展,高 1.75 毫米。花冠白色,但檐部淡红至紫色,长 1.7—1.9 厘米,外疏被具节微柔毛;冠筒前方基部曲膝状,中部宽 2.5 毫米,向上渐宽,至喉部宽达 5 毫米,内面于曲膝处疏被小疏柔毛;冠檐 2 唇形,上唇盔状,先端微凹,下唇中裂片三角状卵圆形,基部宽 4 毫米,先端微凹,两侧裂片卵圆形,宽 2 毫米。雄蕊 4,二强;花丝扁平,中部以下具纤毛。花盘肥厚,前方膨大;子房柄长 0.5 毫米。花柱细长。子房光滑,4 裂,后对裂片较大。成熟小坚果未见。花期 4—5 月。

产四川(巴县);生于海拔 670—820 米的林荫下。模式标本采自四川巴县缙云山。

6. 少脉黄芩

Scutellaria oligophlebia Merr. et Chun in Addenda 577.1977.

多年生草本。茎高 34 厘米,直立,下部无叶且在节上具纤维状须根,分枝,枝条钝四棱形,具纵向细条纹,被极细的短柔毛。叶近革质,卵圆形,长 2—3.8 厘米,宽 1—2.2 厘米,先端锐尖,基部楔形,边缘疏生 3—4 对圆齿,上面绿色,下面紫红色,两

