

laria procumbens Ohwi in Fedde Repert. Sp. Nov. **36**:52. 1934.

这一变种与原变种不同在于叶除下面在脉上具疏而贴生小疏柔毛外两面无毛。产台湾。模式标本采自台湾台中。

9. 钝叶黄芩

Scutellaria obtusifolia Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:296. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:175. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:259. 1929.

9a. 钝叶黄芩(原变种)

var. *obtusifolia*

多年生草本；根茎具纤维状须根。茎高 20—60 厘米，上升，基部近木质，下部常无叶，通常不分枝，钝四棱形，具细条纹，密被短柔毛。叶近革质，椭圆形，椭圆状卵圆形至倒卵圆形，有时近圆形，长 2—5.5 厘米，宽 1.3—3.5 厘米，先端极钝或圆，基部楔形至圆形，全缘或具不明显极少数圆齿，上面淡绿色，无毛或极疏被短柔毛，下面灰绿色，密被灰白色短柔毛，基部三出脉，侧脉 3 对，上面多少凹陷，下面突出且带白色，第三次脉在下面多少突出。花对生，排列成顶生长 4—18 厘米的总状花序；花梗长 4 毫米，与序轴均被具腺微柔毛；苞片菱状倒卵圆形，等长或稍长过花梗，被微柔毛。花萼于花时长约 2.5 毫米，外被具腺微柔毛，内面无毛，盾片开张，半圆形，高 1.8 毫米，果时花萼长 4 毫米，盾片果时高 5 毫米，脉纹明显。花冠紫色或紫蓝色，长 2.6—3 厘米，外疏被微柔毛；冠筒长 2—2.3 厘米，前方基部曲膝状，中部以上渐宽，至喉部宽达 7 毫米，内面无毛环；冠檐 2 唇形，上唇卵圆形，宽 5 毫米，下唇中裂片近圆形，径 4.5 毫米，先端微凹，两侧裂片卵圆形，基部宽 3 毫米。雄蕊 4，二强；花丝扁平，下部疏被纤毛。花盘肥厚，前方膨大；子房柄伸出，长 0.5 毫米。花柱细长。子房光滑。小坚果具瘤。花期 5—6 月，花后果成熟。

产四川(峨眉)，湖北(宜昌)及贵州(赤水)；生于海拔 420—1400 米，森林、灌木丛中或水田旁边湿处。等模式标本采自湖北宜昌及四川峨眉。

民间用全草入药，治泻痢，口苦，感冒。

9b. 三脉变种

var. ***trinervata*** (Vaniot) G. Y. Wu et H. W. Li, comb. nov. —*Scutellaria trinervata* Vaniot in Bull. Acad. Géogr. Bot. **14**:189. 1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:492. 1911; et in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:175. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Göthob. **13**:340. 1939, descr. emend. —*Scutellaria*