

无毛,盾片平展,高约2.2毫米。花冠浅红,下唇有红斑,长2.6—2.9厘米,外被微柔毛;冠筒长2.1—2.3厘米,前方基部曲膝状,中部以上渐宽,至喉部宽达8毫米,内面无毛;冠檐2唇形,上唇盔状,直伸,先端微凹,下唇中裂片三角状卵圆形,基部宽约3.5毫米,先端微凹,两侧裂片卵圆形,宽约2.5毫米。雄蕊4,二强;花丝扁平,近无毛。花盘肥厚,前方膨大;子房柄明显,长0.5毫米。花柱细长。子房光滑。成熟小坚果未见。花期5—6月。

产四川(峨眉);生于海拔1200米左右林内荫处。模式标本采自四川峨眉山。

12. 西畴黄芩 图版34:1—4

*Scutellaria sichourensis* C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 1:543, 图130:8—11.1976.

多年生草本;根茎匍匐,密生纤维状须根。茎高40—80厘米,上升,基部粗约2毫米,多少生不定须根,锐四棱形,下部疏生上部密生锈色具节小柔毛及腺点,有时下部近无毛而带木栓质。叶椭圆形或倒卵状椭圆形,长5—9厘米,宽2.5—4厘米,先端急尖,基部楔形,边缘有波状圆齿,上面绿色,沿叶缘稍密生余部疏生具节小柔毛,下面较淡,灰白色或带紫,无毛,两面均散布浅黄色腺点,侧脉5—6对,上面不明显,下面突出;叶柄长1—1.6厘米,腹凹背凸,腹面密被锈色具节小柔毛,背面无毛。花对生,组成顶生长4.5—7.5厘米的总状花序;总梗长1.4厘米;花梗长3毫米,与序轴均密被具腺柔毛;苞片椭圆形,最下一对较大,长4—4.5(7)毫米,全缘或中部以上具疏锯齿,无柄,两面具腺点,边缘具纤毛。花萼长约2毫米,外被腺点,边缘具纤毛,盾片平展,高约1毫米。花冠淡紫或紫红,长约2.2厘米,外疏被微柔毛及腺点;冠筒长约1.6厘米,前方基部曲膝状,中部以上渐宽,至喉部宽达6毫米,内面无毛;冠檐2唇形,上唇盔状,直伸,先端微凹,下唇中裂片扁圆形,基部宽约5毫米,先端微凹,两侧裂片三角形,基部宽约2.5毫米。雄蕊4,二强;花丝扁平,中部以下被纤毛。花盘肥厚,前方膨大;子房柄不明显。花柱细长。子房光滑。成熟小坚果未见。花期4月。

产云南(西畴);生于海拔1350—1700米的石灰山阔叶林内湿处。模式标本采自云南西畴。

13. 显脉黄芩

*Scutellaria reticulata* C. Y. Wu et W. T. Wang in Addenda 578.1977.

半灌木。茎近圆柱形,上部粗约2毫米,无毛,具细纵条纹。叶椭圆形,长6.5—18厘米,宽2.6—8.2厘米,先端渐尖或稍尾状渐尖,基部楔形,边缘全缘或波状或每侧在中部以上有1—2波状细牙齿,两面无毛,侧脉5—6对,斜上升,近边缘向上弯曲

