

产陕西(终南山);生于海拔 1200 米。模式标本采自陕西终南山。

25b. 少齿变种

var. *paucidentata* C. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 580. 1977.

这一变种与原变种不同在于叶三角形或三角状披针形,每侧有 4—5 对粗大缺刻状牙齿;花较小,长约 2.3 厘米。

产甘肃南部(徽县);生于海拔 1500 米。模式标本采自甘肃徽县。

26. 小紫黄芩 图版 37:1—3

Scutellaria microviolacea C. Y. Wu, 云南植物志 1: 548, 图 132:1—3. 1976.

一年生草本;根茎短,向下簇生有中部稍肥大的须根。茎高 45 厘米,直立,钝四棱形,密被短柔毛,间夹有具节疏柔毛,下部常无叶,上部常分枝。叶近坚纸质,圆形、卵圆形至长圆状卵形,长 2.5—6.5 厘米,宽 1.7—4 厘米,先端锐尖,基部浅心形至截形,边缘具圆齿,上面绿色,下面较淡但常带紫色,两面沿中脉及侧脉被短柔毛余疏被具节柔毛,侧脉 4 对,与中脉上面凹陷下面突出;叶柄长 1—3 厘米,扁平,密被短柔毛。花对生,排列成长 10—12 厘米的顶生或近顶生的总状花序;花梗长 3 毫米,与序轴密被平展具腺微柔毛;苞片细小,线形,长约 2.5 毫米,两面被短柔毛。花萼开花时长约 2 毫米,果时增大,长 3.5 毫米,盾片开花时高 1.5 毫米,果时高 3.5 毫米。花冠红紫色,长 1—1.2 厘米,外被具腺微柔毛,内面在喉部被细微柔毛;冠筒纤细,前方基部呈囊状膝曲状,中部宽 1.2 毫米,至喉部宽 2.5 毫米;冠檐 2 唇形,上唇盔状,内凹,下唇中裂片三角状卵圆形,宽约 3 毫米,两侧内缢,先端微凹,两侧裂片卵圆形,宽 1 毫米。雄蕊 4,二强;花丝扁平,中部以下被小纤毛。花盘肥厚,前方隆起;子房柄极短。花柱细长。子房光滑,无毛。成熟小坚果未见。花期 8 月。

产云南东南部(西畴);生于杉木林中,海拔 1400—1500 米。模式标本采自云南西畴。

27. 莢状黄芩 图版 36:6—12

Scutellaria caryopteroides Hand.-Mazz. in Oester. Bot. Zeitschr. 85: 219. 1936.

图版 35: 1—7. 尊麻叶黄芩 *Scutellaria urticifolia* C. Y. Wu et H. W. Li, 1. 植株上部; 2. 叶面一部分,示具节柔毛; 3. 花,侧面观; 4. 花冠纵剖,内面观; 5. 雌蕊; 6. 果萼; 7. 小坚果。 8—9. 散黄芩 *Scutellaria laxa* Dunn. 8. 叶; 9. 花,侧面观。 10—12. 长管黄芩 *Scutellaria macrosiphon* C. Y. Wu. 10. 根; 11. 叶; 12. 花,侧面观。(曾孝濂绘)

