

方囊状增大,中部以上至喉部逐渐膨大;茎叶膜质,草质,稀至坚纸质,边缘具圆齿至粗大牙齿;苞片常狭小;矮小至中大上升或披散草本。

30. 偏花黄芩 土黄芩(贵州兴义)

Scutellaria tayloriana Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:166. 1913 p. p. et in *ibid.* **6**:175. 1915 p. p.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:252. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:341. 1939—*Scutellaria tayloriana* Dunn var. *polytricha* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 914. 1939—*Scutellaria indica* auct. non Linn.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:295. 1890 p. p. min., quoad pl. Ford.

多年生草本。茎直立或上升,有时具匍匐根茎,连花序高8—30厘米,粗1.2—2.5毫米,四棱形,被白色具节长柔毛,基部多少木质化。叶通常仅有3—4对,初时如莲座状排列,以后由于节间伸长呈交互对生,中部叶最大,坚纸质,椭圆形或宽卵状椭圆形,长4.5—5.5厘米,宽3.8—4.5厘米,下部叶及近花序叶变小,先端圆形或钝,基部心形或圆形,边缘具浅波状圆齿,上面绿色,下面较淡,具橙色腺点,两面均被白色具节糙伏毛,尤以下面沿脉上为甚,侧脉约4对,上面不显著,下面突出,在叶缘内方网结;叶柄长1—5厘米,中部者最长,扁平,密被白色具节长柔毛。花对生,于茎顶上排列成背腹向的总状花序;总状花序长7—15厘米;花萼状,序轴被具节长柔毛,序梗长1—4.5厘米;花梗长约2毫米,有具节长柔毛;苞片小,卵圆形,向花序顶端渐窄,长约4毫米,宽约2毫米,全缘,无柄,被长柔毛及腺点。花萼长约2.5毫米,密被短柔毛。花冠淡紫至紫蓝色,长(1.5)—1.8—2.5(3)厘米,基部成曲膝状,向上渐宽,喉部宽达6毫米,外面疏被微柔毛,内面仅下唇及冠筒中部后方被微柔毛余部无毛,冠檐2唇形,上唇盔状,先端微凹,下唇中裂片半圆形,两侧裂片卵圆形。雄蕊4,二强;花丝细长,扁平,中部以下被纤毛。花盘肥厚,倾斜,前方隆起斜上;子房柄较长或不甚明显。花柱细长,无毛。子房光滑。小坚果未详。花期3—5月。

产广东,湖南西南部,广西东北部,贵州;生于林下灌丛中或旷地上。模式标本采自广东沿海岛屿。

民间用根入药,治热咳、吐血及血痢。

31. 光紫黄芩 图版 38:13—16

Scutellaria laeteviolacea Koidz. in Mayebar. Fl. Austrohig. **50**. 1931; et in Act. Phytotax. Geobot. **1**:23. 1932; Ohwi, Fl. Jap. 1000. 1956—*Scutellaria indica* Linn. var. *japonica* (Morr. et Decne.) Franch. et Sav. f. *humilis*