

毫米。花柱细长。子房无毛,光滑。成熟小坚果未见。花期4—5月;果期8月。

产福建东部;生于海拔500米左右的石山石缝中。模式标本采自福建永泰。

38. 京黄芩 筋骨草、丹参(北京)

Scutellaria peginensis Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang 9:476. 1859; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13:339. 1939——*Scutellaria indica* Linn. var. *pekinensis* Franch. Pl. David. 240. 1884——*Scutellaria planipes* Nakai et Kitagawa in Rep. Exp. Manch. Sect. 4, 1:50. cum. f. 1934; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 385. 1939——*Scutellaria indica* Linn. var. *japonica* auct. non (Morr. et Decne.) Franch. et Sav.: Herder in Act. Hort. Petrop. 10:24. 1887 p. p. min; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:74. 1937——*Scutellaria indica* auct. non Linn.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:295. 1890. p. p.; Liu Chihli Fl. 152. 1928.

38 a. 京黄芩(原变种) 图版 38:5—8

var. *pekinensis*

一年生草本;根茎细长。茎高24—40厘米,直立,四棱形,粗0.8—1.5毫米,绿色,基部通常带紫色,不分枝或分枝,疏被上曲的白色小柔毛,以茎上部者较密。叶草质,卵圆形或三角状卵圆形,长1.4—4.7厘米,宽1.2—3.5厘米,先端锐尖至钝,有时圆形,基部截形,截状楔形至近圆形,边缘具浅而钝的2—10对牙齿,两面疏被伏贴的小柔毛,下面以沿各脉上较密,侧脉3—4对,斜上升,与中脉在上面不明显下面突出;叶柄长(0.3)0.5—2厘米,疏被上曲的小柔毛。花对生,排列成顶生长4.5—11.5厘米的总状花序;花梗长约2.5毫米,与序轴密被上曲的白色小柔毛;苞片除花序上最下一对较大且叶状外余均细小,狭披针形,长3—7毫米,宽1—2毫米,全缘,疏被短柔毛。花萼开花时长约3毫米,果时增大,长4毫米,密被小柔毛,盾片开花时高1.5毫米,果时高4毫米。花冠蓝紫色,长1.7—1.8厘米,外被具腺小柔毛,内面无毛;冠筒前方基部略膝曲状,中部宽1.5毫米,向上渐宽,至喉部宽达5毫米;冠檐2唇形,上唇盔状,内凹,顶端微缺,下唇中裂片宽卵圆形,两侧中部微内缢,顶端微缺,两侧裂片卵圆形。雄蕊4,二强;花丝扁平,中部以下被纤毛。花盘肥厚,前方隆起;子房柄短。花柱细长。子房光滑,无毛。成熟小坚果栗色或黑栗色,卵形,直径约1毫米,具瘤,腹面中下部具一果脐。花期6—8月,果期7—10月。

产吉林,河北,山东,河南,陕西,浙江等地;生于海拔600—1800米间的石坡、潮湿谷地或林下。模式标本采自河北。