

产云南西北部;生于海拔 2500—3100 米山地干燥灌丛或草坡上。模式标本采自云南丽江。

根茎入药,据云有清热,消炎,解毒之功。

49. 中甸黄芩

Scutellaria chungtienensis C. Y. Wu, 云南植物志 1:557. 1976.

多年生草本;根茎垂直或斜行,粗达 8 毫米,淡褐色,上部分叉。茎多数,直立,高(9)15—30 厘米,四棱形,具四槽,粗约 1 毫米,具细条纹,常带紫色,沿棱角上密被倒向的小疏柔毛余部近无毛,分枝。叶坚纸质,卵圆形或椭圆状卵圆形,长(0.9)1.5—3 厘米,宽(0.4)0.9—1.2 厘米,先端急尖,基部圆形至浅心形,边缘有波状细圆齿,上面绿色,下面干时常带紫色,上面全部下面主要沿中脉及侧脉上疏被小疏柔毛,侧脉 3—4 对,与中脉在上面微凹陷下面突出;叶柄长 1—1.5 毫米,腹面具沟,背面突起,被小疏柔毛。花对生,排列成顶生长(3)6—12 厘米的总状花序;花梗长 1.8—3 毫米,与序轴密被平展白色具腺疏柔毛;苞片狭椭圆形或长圆形,长 3—8 毫米,宽 1.5—3.5 毫米,先端锐尖,基部楔形,除最下一对外全缘,被纤毛,无柄或具短柄。花萼开花时长约 2.5 毫米,被白色具腺疏柔毛,果时长 5 毫米,盾片开花时半圆形,平展,高约 1 毫米,果时高 2.5 毫米。花冠紫色或深蓝色,长 1.8—2 厘米,外密被白色具腺小疏柔毛,内面无毛;冠筒近基部前方囊状,十分膝曲,中部宽 1.5 毫米,向上渐宽,至喉部宽达 3.5 毫米;冠檐 2 唇形,上唇盔状,内凹,先端微缺,下唇中裂片近圆形,径约 4.5 毫米,两侧裂片卵圆形,宽约 1.5 毫米。雄蕊 4,二强;花丝扁平,中部被小纤毛。花盘肥厚,前方隆起;子房柄很短。花柱细长。子房褐色,光滑。成熟小坚果未见。花期 6—7 月,果期 7—8 月。

产云南西北部;生于海拔 3000—3300 米的草坡地上。模式标本采自云南中甸。

50. 灰岩黄芩

Scutellaria forrestii Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 5:239. 1912, 7:115, 314. 1912; 399. 1913; Dunn in ibid. 6:176. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:258. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:915. 1936.

50 a. 灰岩黄芩(原变种)

var. **forrestii**

多年生草本;根茎匍匐,增粗,径达 1.5 厘米。茎直立,高 15—20(25)厘米,四棱形,具四槽,具条纹,下部粗约 2 毫米,密被平展白色具节疏柔毛。叶草质,下部者变小,近圆形,长宽约 1 厘米,上部者较大,宽卵圆形,长 1.6—2.5 厘米,宽 1.4—2.2 厘