

产山西北部,内蒙古,河北北部及山东(烟台);生于海拔700—1400米的沙砾地、荒地或草地。模式标本采自河北鸡鸣驿附近。

54. 甘肃黄芩 (中药志)

Scutellaria rehderiana Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berl in **10**:889. 1930; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:339. 1939——*Scutellaria amoena* auct. non G. H. Wright: Adams. in Journ. Bot. **51**:131. 1913; Diels ex Rehd. et Kobuski in Journ. Arn. Arb. **14**:30. 1933; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:75. 1934. (in nota)——*Scutellaria kansuensis* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:76. 1934.

多年生草本;根茎斜行,粗1.5—13毫米,上部不分枝或具分枝,自根茎或其分枝顶端生出少数茎。茎弧曲,直立,高12—35厘米,基部粗约1—1.5毫米,四棱形,沿棱角被下曲的短柔毛,余部近无毛或被疏或密近平展或稍下曲的白色细柔毛,不分枝,稀具短分枝。叶明显具柄,柄长2.8—9(—12)毫米,腹凹背凸,被下曲或近平展的短柔毛;叶片草质,卵圆状披针形,三角状狭卵圆形至卵圆形,长1.4—4厘米,宽0.6—1.7厘米,顶端圆或钝,有时微尖,基部阔楔形、近截形至近圆形,全缘,或自下部每侧有2—5个不规则远离浅牙齿而中部以上常全缘,上面被极稀疏的伏毛或散生细柔毛,下面在脉上疏被细柔毛至疏柔毛,边缘密被短睫毛,几无腺点,侧脉4对,与中脉上面稍凹陷下面隆起。花序总状,顶生,长3—10厘米;苞片卵圆形或椭圆形,有时倒卵圆形,顶端急尖,基部楔形,长3—8毫米,被长缘毛,常带紫色;小苞片针状,长约1毫米,具缘毛;花梗长约2毫米,与序轴密被具腺短柔毛。花萼开花时长约2.5毫米,盾片高约1毫米,密被具腺短柔毛。花冠粉红、淡紫至紫蓝,长1.8—2.2厘米,外面被具腺短柔毛,内面无毛;冠筒近基部膝曲,向上渐增大;冠檐2唇形,上唇盔状,先端微缺,下唇中裂片三角状卵圆形,宽大,宽1.1厘米,先端微缺。雄蕊4,前对较长,具能育半药,退化半药不明显,后对较短,具全药,药室具髯毛;花丝丝状,下半部具小疏柔毛。花柱细长,先端锐尖,微裂。花盘环状,前方稍隆起。子房无毛。花期5—8月。

产甘肃,陕西,山西;生于海拔1300—3150米山地向阳草坡。模式标本采自甘肃南部洮河流域。

55. 连翘叶黄芩 黄芩,魁芩,条芩,子芩,土大芩(四川)

Scutellaria hypericifolia Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:221. 1911——*Scutellaria amoena* G. H. Wright in Kew Bull. Misc. Inf. **1896**:164. 1896 saltem p. p. quoad specim. Pratt. 580, 703——*Scutellaria pachyrrhiza* Pax et