

方稍隆起,后方延伸成长0.5毫米的子房柄。子房4裂,后对裂片较发达。小坚果黑色,卵球形,径0.5毫米,具瘤突,腹面基部具果脐。花期6—7月。

产湖北西部(巴东),四川东部(合江、城口、奉节、南川及綦江),贵州东北部(梵净山)及中部(瓮安),以及陕西南部(秦岭);生于山坡湿地上,海拔830—1500(2300)米。模式标本采自四川城口。

贵州榕江用全草治跌打红肿及风热咳嗽。

69. 狭管黄芩

Scutellaria stenosphon Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:297. 1890; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:211. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:175. 1915.

本种近似岩藿香,但叶较小,较厚,全缘,或具极不明显的圆齿,常钝头;总状花序腋生,苞片小,少数,叶状,花梗较长;花较小,花冠筒极纤细。(标本未见,摘自原描写)

产广东(罗浮山)。

70. 巍山黄芩

Scutellaria weishanensis G. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 **1**:563, 图136:8. 1976.

多年生草本。茎直立,柔弱,锐四棱形,棱上具宽0.25毫米的翅,在节上有白色髯毛余部无毛,常带紫色;节间伸长,茎中部者长约5.5—6厘米。茎叶三角状卵圆形,长1.5—3厘米,宽1.2—1.8厘米,先端锐尖,基部楔形至心形,通常边缘具3—5对不整齐锯齿,上面全部下面仅沿脉上极疏生白色短柔毛,上面绿色,下面较淡但常染紫色,侧脉3对,与中脉在上面凹陷下面隆起;叶柄长3—5毫米,紫色,被短柔毛;苞叶与茎叶同形,细小,长0.5—0.7厘米,常具1对圆齿,具短柄。花着生于短侧枝(长3—7厘米)及茎顶的苞叶腋内,远离,组成总状花序;花梗长3毫米,被短柔毛,近基部有成对长0.5毫米的锥形小苞片。花萼长4毫米,外面沿脉上及边缘具短柔毛,盾片高2毫米。花冠紫红色,长达2厘米,外面密被白色具腺短柔毛;冠筒短粗至直伸,后者纤细,基部微囊大,宽2毫米,至喉部扩大,长6毫米;冠檐2唇形,上唇直伸,短小,盔状,短2裂,下唇中裂片宽大,宽达8毫米,复有4浅裂。雄蕊4,前对稍长,均内藏。花柱先端锐尖,微裂。花盘前方指状突起,后方明显延伸长0.5毫米的子房柄。子房4裂,裂片等大。

产云南西部(大姚,巍山);生于海拔2000—2200米的常绿阔叶林下。模式标本