

膨大;冠檐二唇形,上唇短小,盔状,内凹,先端微缺,下唇中裂片卵圆形,宽4毫米,近全缘,2侧裂片卵圆形,宽1.5毫米。雄蕊4,前对稍长;花丝扁平,中部被疏柔毛。花柱丝状,先端锐尖,微裂。花盘前方隆起,后方延伸成短子房柄。子房4裂,裂片等大。花期5月。

产河南南部;生于坡地上,海拔450米。模式标本采自河南信阳。

74. 峨眉黄芩 白藿香(四川峨眉)

*Scutellaria omeiensis* C. Y. Wu in Addenda 584.1977.

74a. 峨眉黄芩(原变种) 图版44:8—15

var. *omeiensis*

多年生草本;根茎横卧,密生多数须状不定根,在节上生匍枝。茎直立,高50—100厘米,下部数节密生须状不定根,钝四棱形,深四槽,沿棱角上密生白色贴伏疏柔毛,余部近无毛,常不分枝,或在中部以上具腋出的分枝,节间较叶稍长或为叶长的两倍。叶具柄,茎中部叶柄长达1.7厘米,腹凹背凸,被白色贴伏微柔毛;叶片坚纸质,卵圆形,长2.5—5厘米,宽1.5—3.6厘米,茎中部者最大,趋向茎的两端者渐小,茎下部者常早落,先端短渐尖至尾状渐尖,基部平截而下延,边缘具圆齿,上面散布下面仅沿脉上被白色具节小疏柔毛,侧脉约4对,基部一对极发达,上面凹陷下面凸起。花序总状,顶生或腋生,腋生者下部常具一对营养叶,长3.5—9厘米,少花,序轴密被白色上曲微柔毛;花梗长3毫米,密被具腺微柔毛;苞片卵圆形,由茎叶逐渐过渡而成,在花序中部以上者长4—7毫米,均具短柄,全缘,被稀疏白色微柔毛。花萼开花时长约2.5毫米,被具腺微柔毛,口部上方边缘被具节疏柔毛,盾片极发达,高2.2毫米,果时花萼长4毫米,盾片竖起呈倒卵形,高达5毫米。花冠黄色至紫红色,长2.2(2.5)厘米,外被具腺短柔毛,内无毛;冠筒中部直径1.8毫米,基部前方稍膝曲状膨大;冠檐2唇形,上唇半圆形,宽2.8毫米,内凹,先端微缺,下唇中裂片三角状卵圆形,基部宽4.5毫米,先端微缺,2侧裂片卵圆形,宽约2毫米。雄蕊4,前对较长,微露出,具能育半药,退化半药明显,后对雄蕊较短,具全药,药室裂口具髯毛;花丝扁平,前对内侧后对两侧在中部被小疏柔毛。花柱丝状,先端锐尖,微裂。花盘前方隆起,后方延伸成极短的子房柄。子房4裂,后对裂片稍发达。小坚果未见成熟。花期6—7月,果期7—8月。

产四川南部(峨眉、屏山);生于亚热带阔叶林下,海拔1600—3035米。模式标本采自四川峨眉山。

四川峨眉用全草入药,止霍乱呕吐,除风去臭。