

77. 尾叶黄芩 土黄芩(四川筠连)

Scutellaria caudifolia Sun ex G. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. 11(1):

42. 1966.

77a. 尾叶黄芩(原变种) 图版 46:1—5

var. **caudifolia**

多年生草本;根茎粗壮,横卧,具多数密集的须根。茎直立,高 30—45 厘米,四棱形,微具翅,无毛,常带紫色,全株具叶 4—9 对,节间与叶等长或略短。叶具短柄,柄长 4—7 毫米,腹凹,疏被微柔毛,背凸,近无毛;叶片卵圆状长圆形至长圆状披针形,长 5—8 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端尾状渐尖,基部浅心脏形,边缘每侧具 9—15 不均称的疏圆齿,薄纸质,上面黄绿色,无毛,或极疏被萎软状的具节粗糙伏毛,下面淡绿色,无毛,或沿中脉及侧脉上极疏被糙伏毛,侧脉 3 对,斜向上,与中脉均上面凹陷下面凸出且带白色。花序总状,腋生及顶生,少花(6—14 朵),纤细,长 4—10 厘米,腋生者下部常具 2—4 对较小的营养叶,有时该叶腋再生出总状花序;花梗长 2.5—3 毫米,与序轴密被具腺短柔毛,中部稍下有一对线形具小缘毛的小苞片;苞片向上逐次变小,上部者卵圆状圆形,无柄,先端尾状渐尖,边缘具小纤毛。花萼开花时长约 2 毫米,被短柔毛,盾片高 1.2 毫米,果时花萼长 3.5 毫米,盾片高 2.5 毫米,明显具网纹。花冠淡紫色,檐部紫色,长约 2.2 厘米,外疏被具腺微柔毛,内无毛;冠筒基部宽 2 毫米,前方近基部有径达 3 毫米的囊距,在喉部骤然增大,径可达 5 毫米;冠檐 2 唇形,上唇近圆形,内凹,先端微缺,下唇中裂片三角状卵圆形,宽达 5 毫米,先端微缺,2 侧裂片卵圆形,先端圆。雄蕊 4,前对较长,微露出,具能育半药,退化半药不明显,后对较短,内藏,具全药,药室裂口具髯毛;花丝丝状,前对内侧后对两侧下部被疏柔毛。花盘前方隆起,后方延伸成极短的子房柄。子房 4 裂,后对裂片较大。成熟小坚果未见。花期 6—8 月。

产四川(荣经、南川、筠连)及贵州(息烽、凯里);生于林缘、沟边,海拔 900—1720 米。模式标本采自四川荣经。

77b. 斜叶变种 野鸡黄(四川兴文) 图版 46:6—9

var. **obliquifolia** C. Y. Wu et S. Chow in Addenda 585.1977.

图版 45: 1—8. 石蜈蚣草(原变型) **Scutellaria sessilifolia** Hemsl f. **sessilifolia**, 1. 植株; 2. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 3. 雌蕊; 4. 雄蕊; 5. 花萼果时闭合形状; 6. 果萼上唇, 内面观; 7. 果萼下唇, 内面观, 示小坚果着生情况; 8. 苞片。9. 石蜈蚣草顶序变型 **Scutellaria sessilifolia** Hemsl. f. **terminalis** C. Y. Wu et S. Chow, 9. 叶。(刘春荣绘)