

花萼长5毫米,盾片直伸,高1.5毫米。花冠紫色、紫蓝至蓝色,长约1.8厘米,外被具腺短柔毛,内于上唇及下唇2侧裂片间被微柔毛;冠筒基部微囊大,宽约1.5毫米,向上渐增大,至喉部宽3.5—5毫米;冠檐2唇形,上唇半圆形,宽2.5毫米,盔状,内凹,先端微缺,下唇中裂片三角状卵圆形,先端微缺,基部宽6毫米,2侧裂片长圆形,宽1.5毫米。雄蕊4,均内藏,前对较长,具能育半药,退化半药不明显,后对较短,具全药,药室裂口具髯毛;花丝扁平,前对内侧后对两侧中部以下被疏柔毛。花柱细长,先端锐尖,微裂。花盘前方隆起,后方延伸成长0.5毫米的子房柄。子房4裂,裂片等大。小坚果黄色,三棱状卵圆形,径1毫米,具小瘤突,腹面中央具果脐。花期6—7月,果期7—8月。

产陕西(榆林),新疆(乌鲁木齐、塔城、托里),内蒙古北部;见于水沟旁冲积地上,海拔440—1060米。欧洲各国,苏联远东地区,蒙古,日本也有。模式标本采自欧洲。

系2.狭叶黄芩系——*Ser. Regelianae* Juz. in *Not. Syst. Herb. Hort. Bot. URSS* 14:359. 1951, et in *Fl. URSS* 20:92. 1954.

花较大,长2—2.5厘米;根茎纤细;叶细长,全缘,边缘稍内卷,被毛,下面具腺点。

80. 狭叶黄芩

Scutellaria regeliana Nakai in *Bot. Mag. Tokyo* 35:197. 1921; Kudo in *Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ.* 2:263. 1929; Kitagawa, *Lineam. Fl. Mansh.* 385. 1939; Juz. in *Fl. URSS* 20:95. 1954——*Scutellaria galericulata* Linn. γ . *angustifolia* Regel in *Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. VII.* 4:118, n. 388. 1861——*Scutellaria angustifolia* (Regel) Komarov in *Act. Hort. Petrop.* 25:345, t. 4, f. L. 1907 descr. emend. p. p.; in Fedde, *Repert. Sp. Nov.* 5:272. 1908; Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 39:491. 1911; Nakai in *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo* 31:143. 1911, non Pursh 1814.

80 a. 狭叶黄芩 (原变种)

var. *regeliana*

多年生草本;根茎直伸或斜行,纤细,在节上生须根及匍枝。茎直立,高26—30厘米,四棱形,具沟,基部粗1.2—1.5毫米,被有上曲短小柔毛,通常在棱上较密集,

图版 48: 盔状黄芩 *Scutellaria galericulata* Linn. 1. 植株上部; 2. 植株下部, 示根茎; 3. 花, 侧面观; 4. 雌蕊; 5. 花萼开花时形状; 6. 花萼果时闭合形状; 7. 小坚果, 腹面观; 8. 小坚果, 侧面观。(肖溶绘)