

房4裂,裂片等大。花期8月。

产新疆(巩留);生于小山顶草地上,海拔1880米。苏联也有。模式标本采自苏联。

亚组2.高山黄芩亚组——Subsect. *Alpinae* Juz. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **14**:363. 1951; et in Fl. URSS **20**:175. 1954.

灌木,半灌木或多年生草本;叶两面绿色或灰绿色,较疏生或稍密生直伸或卷曲的短柔毛,但绝不是绒毛,有时混杂有具柄腺毛;花组成穗状密集花序;苞片宽大,卵圆形或椭圆形,膜质或偶近草质;花冠筒较短而宽,几乎全长等于宽,只在顶部骤然扩大成喉部,下唇片通常(但不绝对)比较不长,与上唇片同长或较短。

系1. 仰卧黄芩系——Ser. *Supinae* Juz. in Fl. URSS **20**:179. 1954.

叶毛被比较不多,齿大都明显;苞片排列疏松;多年生草本,大多中生型外貌。

94. 仰卧黄芩

Scutellaria supina Linn. Sp. Pl. 598. 1753 p. p. excl. pl. e “Tataria” et syn. Tournef.; Juz. in Fl. URSS. **20**:183. 1954.

多年生半灌木;根茎木质,斜行或伏地。茎多数,高10—45厘米,上升或有时近于直立,不分枝或甚分枝,被有多少贴生而下向的短柔毛,杂有疏生平展的长柔毛(在茎上部尤多),淡黄绿色或稍带紫色。叶长圆状卵圆形或卵圆形,长1—4厘米,宽0.6—2厘米,先端钝或微钝,上部叶有时微尖,边缘具浅而相当大4—7对圆齿状锯齿,上面常被有散生或稍多的下弯而基部常瘤状的短硬毛或长硬毛,下面有腺点,通常如上面全部被硬毛或仅沿脉上有长或短的疏柔毛;下部叶叶柄长达1.5厘米,长约为叶片全长之半,毛被同茎,上部叶近于无柄。花序短而紧密,果时微伸长,长2.5—4厘米;苞片宽大,卵圆形,稀长圆状卵圆形,下部者长1.5—2厘米,宽0.5—1.2厘米,先端稍钝或甚锐尖,淡绿色或局部带紫色,疏被疏柔毛,杂有具短柄的腺毛,或有时近于无毛,边缘具长纤毛。花萼长约2毫米,被具腺疏柔毛。花冠通常较大,长2.2—3.5厘米,黄色,外被具腺短柔毛。小坚果长约1.5毫米,三棱状卵圆形,被短星毛。(标本未见,摘自原描写)

产新疆北部;生于砾石或草甸坡地至高山带。苏联也有。模式标本采自苏联。

95. 平卧黄芩

Scutellaria prostrata Jacq. in Benth. Labiat. Gen. et sp. 733. 1832—36, et in DG. Prodr. **12**:413. 1848.