

面无毛,脉5,凸出,齿5,不等大,长1—1.5毫米,三角形,先端刺尖,边缘有细纤毛,在果时明显展开,且2齿稍大。花冠白色,稀粉红色,稍伸出萼筒,长约7毫米,外面被绵状长柔毛,内面被微柔毛,在花丝基部有短柔毛;冠筒长约5毫米,径约1.5毫米;冠檐二唇形,上唇直伸,比下唇长,长圆形,全缘,下唇斜展,3浅裂,中裂片扁圆形,2侧裂片椭圆形。雄蕊4,着生于冠筒中部稍下,不伸出,后对较短;花药卵圆形,2室。花柱先端2浅裂。花盘平顶。小坚果长卵形,长约1.5毫米,褐色,有鳞秕。花期3—4月,果期5—6月。

产黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,河北,河南,山西,山东,浙江,江苏,安徽,湖北,陕西,甘肃,新疆,青海,四川,贵州,云南等地;为一杂草,生于路旁、旷地上,在西北、西南各省区海拔可高达2600米以上。苏联西伯利亚,朝鲜也有。模式标本采自苏联西伯利亚东部。

云南有些地方用全草入药,据云功用同益母草。

2. 荆芥族——Nepeteae Benth.

Benth. *Labiatae* Gen. et Sp. 462. 1834, in DG. Prodr. **12**: 368. 1848, et in Benth. et Hook. f. *Gen. Pl.* **2**: 1167. 1876; Briq. in Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **4, 3a**: 207, 233. 1897; Pojark. in *Fl. URSS* **20**: 273. 1954——*Stachydeae* subtrib. *Nepetinae* Kudo in *Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ.* **2**: 219. 1929.

18. 藿香属——*Agastache* Clayt. in Gronov.

Clayton in Gronov. *Fl. Virgin.* 88. 1762; O. Ktze. *Rev. Gen. Pl.* **2**: 511. 1891——*Lophanthus* sect. *Chaistandra* Benth. *Labiatae* Gen. et Sp. 462. 1834.

多年生高大草本。叶具柄,边缘具齿。花两性。轮伞花序多花,聚集成顶生穗状花序。花萼管状倒圆锥形,直立,具斜向喉部,具15脉,内面无毛环。花冠筒直,逐渐而不急躁扩展为喉部,微超出花萼或与之相等,内面无毛环,冠檐二唇形,上唇直伸,2裂,下唇开展,3裂,中裂片宽大,平展,基部无爪,边缘波状,侧裂片直伸。雄蕊4,均能育,比花冠长许多,后对较长,向前倾,前对直立上升,药室初彼此几平行,后来多少叉开。花柱先端短2裂,具几相等的裂片。花盘平顶,具不太明显的裂片。小坚果光

滑, 顶部被毛。

9 种, 1 种产亚洲东部, 8 种产北美洲; 我国产 1 种。

1. **藿香** (嘉祐本草) 合香 (陕西周至, 湖北利川), 藿香 (陕西洋县), 苍告 (陕西丹凤), 山茴香、山灰香 (河北内邱), 红花小茴香、家茴香 (河北内邱), 香薷 (河北蔚县), 香荆芥花 (河北), 把蒿、猫巴蒿 (辽宁), 猫巴虎 (辽宁东部及南部), 猫尾巴香、山猫巴 (辽宁本溪、北镇), 仁丹草、野苏子 (辽宁庄河), 拉拉香 (辽宁新宾)、八蒿 (吉林饶河), 白荷 (江西虔南), 薄荷 (江西寻乌), 土藿香 (江苏太苍、徐州, 四川重庆), 大叶薄荷 (浙江龙泉), 山薄荷 (浙江临安), 野薄荷 (浙江东阳), 野藿香 (浙江江山), 小薄荷 (湖北均县), 鱼子苏 (湖北平江), 杏仁花 (湖南新化), 叶藿香、苏藿香、大薄荷、鸡苏 (四川重庆), 白薄荷 (四川峨眉), 鱼香 (四川米易), 紫苏草 (四川康定), 水麻叶 (四川茂汶), 青茎薄荷 (广西), 排香草、兜婆婆香 (中国药用植物志) 图版 53

Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. **2**:511. 1891; Briq. in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. **4, 3a**:234. 1897; Gilg in Engler, Bot. Jahrb. **34**(75):63. 1904; Matsum. Ind. Pl. Jap. **2**(2):535. 1912; Matsum. et Kudo in Bot. Mag. Tokyo **26**:296. 1912; Kudo in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **43**(8):16. 1921 (cum var. *hypoleuca* et f. *lanceolata* Kudo); Nakai in Bot. Mag. Tokyo **35**:169. 1921; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:220. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:77. 1934; 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**:229. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:915. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 374. 1929; Pojark. in Fl. URSS **20**:274. 1954——*Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. **1**:31. 1835; Benth. in DG. Prodr. **12**:369. 1848; Maxim. in Mem. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang. **9**:218. 1859; Franch. Pl. David. **1**:237. 1884, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg. **24**:242. 1884, et in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II, **10**:69. 1887; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:288. 1890; Diels in Engler Bot. Jahrb. **29**:553. 1900; Palibin in Act. Hort. Petrop. **21**:226. 1903; Komarov in ibid. **25**:349. 1907; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:210. 1912; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**:167, 245, 314. 1912, **8**:373. 1913; Dunn in ibid. **8**:160. 1913, **6**:165. 1915; Liu, Chihli Fl. 150. 1928; 胡先骕, 蔡希陶, 静生汇报 **2**:259. 1931; 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**:234. 1932; Belval in Mas. Heade Notes Bot. Chin. **2**:103. 1932 ——? *Lophanthus argyi* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**:18. 1913——