

形的顶生头状花序,常有 1(稀 2)个下部的轮伞花序远离。萼喉极斜或呈二唇状,齿比萼筒短许多,披针形或三角形。花冠下唇中裂片边缘微缺或全缘。苞片稍短于萼。

9. 平卧荆芥

Nepeta supina Stev. in Mém. Soc. Nat. Moscou **3**:265.1812; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 473. 1834, et in DC. Prodr. **12**:374. 1848; Hook. f. in Fl. Brit. Ind. **4**:658.1885; Pojark. in Fl. URSS **20**:326. 1954.

多年生植物;根须状,多少扭曲,向上过渡成分枝的根茎,根茎表皮如根一样呈黑褐色,其上满布鳞片状叶。茎多数,高 10—30 厘米,外倾或几平卧,多少密被具节短柔毛,满布白色头状小腺体,不分枝或具不多的侧枝,下部的分枝往往平卧,伸长,但极少发育有花序,其余的较短,具不发达的节间。叶黄绿色,幼时通常密被具乳头的单毛及小腺毛,下面具点状腺体,除脉外几无毛;茎生叶长 1—2(2.5)厘米,宽 0.7—1.8(2)厘米,卵形,先端锐尖或钝,基部截形或圆形,有时楔形或浅心形,侧枝上的叶较小且较狭,边缘具等大的大牙齿或近圆齿;叶柄短,长 2—3 毫米,上部叶无柄。轮伞花序几无梗,聚集成十分紧密的圆状卵形的头状花序,有时下部的 1 个轮伞花序远离;苞叶与上部茎叶相似,苞片比萼稍短,披针状线形或线形,与萼一样表面满布很小的腺毛,边缘被长而具节的单毛呈密流苏状。花萼长 7—8.5 毫米,微弯,下部(稀全部)蓝色,二唇形或近二唇形,后 3 齿三角形,锐尖或近渐尖,为萼筒长的 $1/3—1/4$ ($1/6$),前 2 齿披针形或狭披针形,长渐尖,有时钻状渐尖,比后齿长 1.5—2 倍。花冠蓝色,长 14—20 毫米,冠筒超出萼长一倍,向上扩展成宽 5—6 毫米、长 4.5—5.5 毫米的喉部,冠檐二唇形,上唇长 2.5—3.3 毫米,几深裂主本身基部而成钝而阔的卵形的 2 裂片,下唇 3 裂,中裂片倒梯形,长 3—4 毫米,宽 6—7 毫米,侧裂片半圆形,长 1—1.3 毫米,宽 2—2.5(3)毫米。后对雄蕊与上唇等长,前对明显比后对短。小坚果深褐色,长椭圆形,长 2 毫米,宽 0.75—1 毫米。花期 7—9 月,果期在 8 月以后。(标本未见,综合前人描写)

产西藏西部;生于高山岩石裂缝中,海拔 3600 米。苏联高加索,巴基斯坦也有。模式标本采自苏联高加索。

10. 绒毛荆芥

Nepeta kokanica Regel in Izv. Obschch. Estestv. Antrop. Etnogr. Mosk. Univ. Geogr. Otd. **34**(2):65. 1882; Pojark. in Fl. URSS **20**:328.1954.

多年生多茎植物,全体因密被毛茸而呈浅灰色或白色;根粗达 4 厘米,暗褐色,扭曲,极多分叉,顶部过渡成根茎;根茎有少数藏于砾石内的多少木质化的残余茎基部,