

茎仅下部具叶,也仅于下部分枝,上部的叶腋内仅发育无叶的花序总梗,总梗长或短,端生头状轮伞花序。

11. 丛卷毛荆芥

Nepeta floccosa Benth. Labiat. Gen. et Sp. 736.1835, et in DC. Prodr. 12:380. 1848; Hook. f. in Fl. Brit. Ind. 4:662.1885.

多年生植物。茎多数,白基部上升,粗壮或纤细,中央的常高66—100厘米,极叉开的分枝,钝四棱形,被白色丛卷毛状绵毛。叶圆心脏形,径2.5—7.5厘米,侧枝上叶较小,花叶极小,被稀疏白色绵毛,边缘具圆齿,有时波状;叶柄粗壮,长至10厘米。轮伞花序密集多花,头状,常着粉红色或紫色,疏生于极平展的侧枝上或顶生于长2.5—7.5厘米的总梗上,长1.25厘米,被绵毛;苞片线状钻形,与萼等长。花萼长6.2—3.8毫米,被长柔毛,口斜,齿比萼筒短许多,后齿三角形或披针形,前齿比后齿短许多。花冠长约8.3毫米,冠筒纤细,与萼等长,冠檐小。小坚果长约2毫米,光滑。(标本未见,综合前人描写)

产西藏西部;生于海拔2120—3330米。阿富汗东部,克什米尔地区也有。模式标本采自西藏西部。

12. 淡紫荆芥

Nepeta yanthina Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 3:324.1897.

基部半灌木状,分成多数直立的分枝,被短而疏的绵毛(尤其是在叶子上),茎仅被小疏柔毛。叶具柄,下面的叶柄较长,上面的较短或极短,叶片心状卵形,钝形,具不规则的圆齿状牙齿或近深缺刻状,具泡状隆起。苞片短,全缘,披针形,具小突尖,小苞片钻形,被紫色绵毛,较萼短;下部的轮伞花序腋生,多少远离,通常具总梗,上部的无梗或近无梗,全部由密集之花组成;花萼淡紫色,明显二唇形,上唇的齿几叉开,下面的3齿前伸,稍长,均披针形,先端钻形,被紫色绵毛;花冠小,微超过萼。(标本未见,摘自原描写)

产西藏西部班公湖及老康。

组4.大荆芥组——Sect. *Macronepeta* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 467, 482. 1834, p. p. quoad typum; Pojark. in Fl. URSS 20:341. 1954——Sect. *Eunepeta* *Macronepeta* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:237.1897, p. p.

高大多年生植物。花萼管状,弯,具斜喉。花冠中等大小或大(长1—3.5厘米),具细而弯的花冠筒,冠筒急骤扩展为宽喉,其纤细部分为萼长之1.5—3倍,花冠下唇