

中裂片下垂,扁平,先端微缺,基部内面具髯毛。

系 1. 西伯利亚系——Ser. *Sibiricae* Pojark. in Fl. URSS 20:341. 1954.

茎生叶狭,具短柄,或下部叶柄长。轮伞花序多少具梗,彼此远离或极少有时聚集而梗极短。花两性或稀为雌性两性花同株。

13. 蓝花荆芥 图版 56:6

Nepeta coerulescens Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. 27:529.1881, et in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 9:306.1881; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:289.1890; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:232.1929; Hao in Engler, Bot. Jahrb. 68:634.1938——*Dracocephalum coerulescens* (Maxim.) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8:166. 1913; 6:168,171.1915; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 164:t. 9646, sub nota, 1943.

多年生草本;根纤细而长。茎高 25—42 厘米,不分枝或多茎,被短柔毛。叶披针状长圆形,长 2—5 厘米,宽 0.9—2.1 厘米,生于侧枝上的小许多,先端急尖,基部截形或浅心形,上面橄榄绿色,下面略淡,两面密被短柔毛,下面除毛茸外尚满布小的黄色腺点,边缘浅锯齿状,纸质,脉在上面下陷,下面稍隆起;上部的叶具短柄(长 1—2.5 毫米)或无柄,下部的叶柄较长,长 3—10 毫米。轮伞花序生于茎端 4—5(10)节上,密集成长 3—5 厘米卵形的穗状花序,或展开长达 8.5—12 厘米,具长 0—2 毫米的总梗;苞叶叶状,向上渐变小,近全缘,发蓝色,苞片较萼长或近等长,线形或线状披针形,发蓝色,被睫毛。花萼长 6—7 毫米,外面被短硬毛及黄色腺点,口部极斜,上唇 3 浅裂,齿三角状宽披针形,渐尖,下唇 2 深裂,齿线状披针形。花冠蓝色,长 10—12 毫米,外被微柔毛,冠筒长约 6 毫米,宽 1.5 毫米,向上骤然扩展成长 3—3.5 毫米、宽约 4.5 毫米的喉,冠檐二唇形,上唇直立,长约 3 毫米,2 圆裂,下唇长约 6.5 毫米,3 裂,中裂片大,下垂,倒心形,长约 3 毫米,宽约 3.5 毫米,先端微缺,基部具隆起,被髯毛,侧裂片外反,半圆形,长 1.5 毫米,宽 2 毫米。雄蕊短于上唇。花柱略伸出。小坚果卵形,长 1.6 毫米,宽 1.1 毫米,褐色,无毛。花期 7—8 月,果期 8 月以后。

产甘肃西部,青海东部,四川西部及西藏南部;生于山坡上或石缝中,海拔 3300—4400 米。模式标本采自甘肃西部黄河上游。

14. 黑龙江荆芥

Nepeta manchuriensis S. Moore in Journ. Bot. Brit. & For. 18:5. 1880; Pojark. in Fl. URSS 20:341.1954.

