

18. 膜叶荆芥

Nepeta membranifolia G. Y. Wu, 云南植物志 1:574, 图 140:3—4. 1976.

多年生草本。根粗厚, 木质, 深褐色, 上部过渡为根茎, 由其上生出若干个茎。茎高 45—60 厘米, 四棱形, 被微柔毛, 上部被腺微柔毛, 腋生侧枝常不育, 短, 长 1—2.5 厘米, 具 1—2 对叶(叶较主茎者小许多), 或能育而具 2 特长的节间(长 6.5—10.5 厘米)。叶长圆状披针形, 下部的较宽, 向上渐变狭, 长 5.5—10.5 厘米, 宽 2—3.8 厘米, 先端钝, 基部圆形或浅心形, 上面橄榄绿色, 下面较淡, 两面被微柔毛, 脉在上面平, 下面微突出, 边缘为具小突尖的粗圆齿, 膜质; 叶柄长 2.5—1 厘米, 向上渐短。聚伞花序具短梗, 总梗长(25)5—2 毫米, 花序生于主茎及分枝顶部 3—5 节上, 排列靠近, 少花; 苞叶叶状, 较茎叶小许多, 长约 2 厘米, 至苞片状, 长约 6 毫米, 苞片线形, 长 1.5—2 毫米, 被腺微柔毛。花萼长 9—10 毫米, 外面被腺微柔毛, 喉极斜, 上唇 3 齿三角状披针形, 长 1.8—2.1 毫米, 下唇 2 齿线形, 长 4.2—5 毫米。花冠紫色, 长 2—2.2 厘米, 外面疏被微柔毛, 冠筒微弯, 基部宽 1.2—1.5 毫米, 其狭窄部分稍伸出萼, 向上骤然扩展成长 6.5 毫米、宽 7 毫米的喉部, 冠檐二唇形, 上唇深 2 圆裂, 直立, 长约 3.5 毫米, 下唇斜向上, 长约 1 厘米, 中裂片倒心形, 先端 2 圆裂, 基部内面具髯毛, 侧裂片斜半圆形, 显著。后对雄蕊短于上唇。花柱先端 2 裂, 伸出花冠。 花期 8 月。

产云南西北部(德钦、鹤庆); 生于谷地杂木林内, 海拔 3100 米。模式标本采自云南德钦白马雪山。

19. 狭叶芥荆 图版 56:9

Nepeta souliei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:221.1911; Diels in Fedde, Repert. Nov. Sp. Beih.:12:477.1922——*Dracocephalum stewartianum* Dunn in Notes Bot.Gard. Edinburgh 6:172.1915, p. p. quoad Wilson Veitch Exp. 4366, non *Nepeta stewartiana* Diels——*Dracocephalum souliei* (Lévl.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:80.1934, in obs; 13:344.1939; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 164:sub t. 9646.1943——*Dracocephalum sibiricum* auct. non Linn.:Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8:166.1913, quoad specim. Soulie.

多年生草本; 根茎木质, 其上具纤维状须根。茎高 60—80 厘米, 通常分枝, 稀不分枝, 茎及分枝钝四棱形, 密被短柔毛。叶片宽披针形、披针状长圆形至狭披针形, 长 3.5—6(9.5)厘米, 宽(1.5)1.8—2.4 厘米, 先端急尖, 基部圆形或近截形至浅心形, 边缘具细钝锯齿或锐齿, 纸质, 上面橄榄绿色, 被短微柔毛, 下面发灰白, 密被短柔毛, 有时混生黄色小腺点, 侧脉 6—8 对, 斜上升, 与中肋在上面微凹陷, 下面隆起。 轮伞