

花序排列疏松，生于茎或花枝顶部4—6节上，具短梗；苞叶叶状，向上渐变小，具短柄或无柄，苞片线形，较萼短或有时等长，被睫毛；花梗极短，与总梗密被短柔毛及腺体。花萼长6—8毫米，外被腺短柔毛及睫毛，喉部极斜，上唇3齿，裂至本身长 $\frac{1}{3}$ ，长三角形，先端锐尖，下唇2齿，狭披针形，先端渐尖。花冠长1.6—2.2(2.5)厘米，雌花较小，长约1.4厘米，细瘦，紫色，下唇白色具紫色斑点，外疏被微柔毛，内面在下唇中裂片基部具黄色髯毛，两性花冠筒细长，微弯，基部宽1.5毫米，其狭窄部分伸出萼近一倍，向上骤然扩展成长约10毫米、宽7毫米的喉部，冠檐二唇形，上唇长宽约5毫米，深裂至中部成2钝裂片，下唇斜展，中裂片长4毫米，宽6毫米，倒心形，先端中部具弯缺，边缘嚼蚀状，侧裂片半圆形，长约1.5毫米。后对雄蕊微伸出上唇。花柱略伸出上蕊。成熟小坚果未见。花期7—10月。

产四川西部(木里、康定、道孚)及西藏东部；生于山地草坡或疏林中，海拔2600—3350米。模式标本采自西藏东部。

系2.康藏荆芥系——Ser. Prattianae C. Y. Wu et Hsuan in Addenda: 588.1977.

叶无柄或下部的具极短的柄。轮伞花序多花，无梗。花两性。

20. 康藏荆芥 野菴香(四川小金) 图版56:1—4

Nepeta prattii Lévl. in Repert Sp. Nov. Fedde **9**:245. 1911——*Nepeta macrantha* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:470. 1911, quoad Pratt 501——*Dracocephalum robustum* Nakai et Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4, part **1**:46, t. 15.1934——*Dracocephalum prattii* (Lévl.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:79, 1934, Symb. Sin. **7**:919. 1936; Hao in Engler, Bot. Jahrb. **63**:634. 1938; Sealy in Curtis's Bot. Mag. **164**:sub t. 9646. 1943——*Dracocephalum sibiricum* auct. non Linn.:Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:166. 1913, in ibid. **6**:168, 171. 1915, p. p. quoad Pratt 501 et syn. *Nepeta prattii* Lévl.

多年生草本。茎高70—90厘米，四棱形，具细条纹，被倒向短硬毛或变无毛，其间散布淡黄色腺点，不分枝或上部具少数分枝。叶卵状披针形、宽披针形至披针形，长6—8.5厘米，宽2—3厘米，向上渐变小，先端急尖，基部浅心形，边缘具密的牙齿状锯齿，上面橄榄绿色，微被短柔毛，下面淡绿色，沿脉疏被短硬毛，余部被腺微柔毛及黄色小腺点，侧脉每侧6—8，斜上升，与中肋在上面微隆起下面隆起；下部叶具短柄，柄长3—6毫米，中部以上的叶具极短的柄以至无柄。轮伞花序生于茎、枝上部3—9

节上,下部的远离,顶部的3—6密集成穗状,多花而紧密;苞叶与茎叶同形,向上渐变小,长1.2—1.5厘米,具细锯齿至全缘,苞片较萼短或等长,线形或线状披针形,被腺微柔毛及黄色小腺点,具睫毛。花萼长11—13毫米,疏被短柔毛及白色小腺点,喉部极斜,上唇3齿宽披针形或披针状长三角形,下唇2齿狭披针形,齿先端均长渐尖。花冠紫色或蓝色,长2.8—3.5厘米,外疏被短柔毛,冠筒微弯,基部宽1.5毫米,其伸出萼的狭窄部分约等于萼长,向上骤然宽大成长达10毫米宽9毫米的喉,冠檐二唇形,上唇裂至中部成2钝裂片,下唇中裂片肾形,先端中部具弯缺,边缘锯齿状,基部内面具白色髯毛,侧裂片半圆形。雄蕊短于下唇或后对略伸出。花柱先端近相等2裂,伸出上唇之外。小坚果倒卵状长圆形,长约2.7毫米,宽1.5毫米,腹面具棱,基部渐狭,褐色,光滑。花期7—10月,果期8—11月。

产西藏东部,四川西部,青海西部,甘肃南部,陕西南部,山西及河北北部;生于山坡草地,湿润处,海拔1920—4350米。模式标本采自西藏东部靠近昌都地区。

21. 圆齿荆芥 图版56:10

Nepeta wilsonii Duthie in Gard. Chron. ser. 3, 40:334, f. 134. 1906, et in Fedde, Repert. Sp. Nov. 4:4.1908; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39:470. 1911; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 12:145, 314.1912; 8:378.1913; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:232.1929——*Dracocephalum wilsonii* (Duthie) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8:166.1913, 6:168, 171.1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:80.1934, Symb. Sin. 7:918. 1936, et in Act. Hort. Göthob. 13:344.1939; Sealy in 164:sub t. 9646. 1943, in nota——*Dracocephalum sibiricum* auct. non Linn.:Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:171.1915, quoad Wilson Veitch Exp. 4363, p. p.

多年生草本;根木质,暗褐色,长长下伸,撕裂状,侧生纤维状须根,向上过渡成根茎。茎高35—70厘米,不分枝,直立,四棱形,疏被倒向的短柔毛。叶长圆状卵形或椭圆状卵形,长4—7.4厘米,宽1.9—3厘米,先端钝,基部浅心形或近截形,边缘为密圆齿状,先端一圆齿较大,坚纸质,上面橄榄绿色,有时变黑,密被极短柔毛,下面略淡,疏被短柔毛及淡黄色腺点,侧脉6—8,斜上升,与中肋在上面凹陷,下面隆起,网脉在上面凹陷下面稍隆起;茎中部以下的叶几无柄或具极短的柄(长1.5—4毫米),上部的叶无柄。轮伞花序生于茎顶2—6节上,下部的远离,上部的2—3节常连接成穗状;苞叶叶状,比轮伞花序长或近等长,向上渐变小而全缘,苞片披针形至线形,长为萼长 $\frac{1}{2}$ 或较其稍短,被长睫毛。花萼长9—11毫米,外疏被柔毛及长睫毛,并有混

