

无毛。花柱微伸出花冠,先端二裂。小坚果长圆状卵形,光滑,褐色。 花期约7月,果期8—9月。

产西藏中部和南部(拉萨附近及定结);生于高山砂石山坡上或谷地,海拔4800—5000米。模式标本采自西藏拉萨附近海拔5000米处。

据 Hemsley 的原描述“萼内面及外面被柔毛”,在其附图上亦明显绘出花萼内面除中部的毛较长而略密外,中部以上萼齿等处均有毛,但按我们所见到的标本看,花萼内面仅中部具毛环,这与工藤祐舜所提的相符,由于未见到模式标本或同地模式,特提出今后加以注意。

3. 雪地扭连钱 图版 66:12—13

Phyllophyton nivale (Jacquem.) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**:10. 1959——*Glechoma nivalis* Jacquem. ex Benth. Labiat. Gen. et Sp. 737. 1835; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:283. 1897——*Nepeta nivalis* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 737. 1835, et in DG. Prodr. **12**:391. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:664. 1885——*Pseudolophanthus nivalis* (Jacquem.) Levin in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **5**:295, f. 9b. 1941.

多年生草本,全株被长硬毛,具腺点。茎多分枝或单一,高10—15(?)厘米,下部几无叶,茎上部叶紧密呈覆瓦状排列,正圆形、圆状卵形或近肾形,长1.5—2.2厘米,宽1.0—2.4厘米,基部圆形或近于心形,边缘具圆齿,无柄或几无柄;茎下部叶小。花于叶腋内,组成聚伞花序,聚伞花序具短梗,但上部的几无梗,中部的梗长2—5毫米;苞叶与茎叶同形,几等于或仅较短于聚伞花序;苞片小,线状钻形。花萼管形,上部膨大,几不弯曲,二唇形或近二唇形,长8—10毫米,内面具疏柔毛毛环,齿5,三角形或披针形,狭,为萼筒长的 $1/2-1/3$ 。花冠浅蓝色(据Bentham),长为花萼的1.5倍,长15—17毫米,冠筒伸出萼,向上逐渐膨大,倒扭,冠檐二唇形,上唇(倒扭后变下唇)2裂,裂片宽卵形,下唇(倒扭后变上唇)3裂,中裂片较大,横向较宽,具小齿,两侧裂片较小,宽卵形。后对雄蕊(倒扭后变前对)和花柱伸出花冠,前对雄蕊(倒扭后变后对)不伸出。药室略叉开。花柱顶端细二裂。小坚果长圆状卵形,光滑,褐色。(标本未见,摘自 Levin 描写)

产西藏西部;生于极高山的乱石滩上,海拔4950—5300米。模式标本采自西藏西部高山乱石滩上。

4. 西藏扭连钱

Phyllophyton tibeticum (Jacquem.) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):

