

2b. **走茎变种** 红紫苏(贵州梵净山,引自贵州草药 1:497), 木樨臭(江西婺源)

var. **radicans** (Vaniot) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):13.1959—*Dracocephalum radicans* Vaniot in Bull. Acad. Georg. Bot. **14**:180.1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *typica* Dunn f. *normalis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**(28):170.1915, p. p. maj.—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *typica* Dunn f. *radicans* Dunn in l. c. 170.1915, quoad specim. Henryan. Yunnanens. (?)—*Meehanian urticaefolia* (Miq.) Makino var. *henryi* (Hemsl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:224.1929, p. p.—*Meehanian urticifolium* (Miq.) Makino var. *typica* (Dunn) Hand.-Mazz. f. *radicans* (Dunn) Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:916. 1936—*Dracocephalum urticifolium* auct. non Miq.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:293.1890, p. p.; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **5**(3):426.1936.

这一变种与原变种不同在于茎较粗壮而长,通常超过 30 厘米,有多分枝,常形成匍匐生根的走茎;叶常为长圆状卵形,长 3—15 厘米,具圆锯齿,基部心形;花通常为腋生双花,总梗极短,常着生于茎最上部的 1—3 节上。

产浙江,江西,湖北,广东,四川,贵州及云南;生于常绿及落叶阔叶混交林下荫处,海拔 1200—1800 米。模式标本采自贵州贵阳青岩狮子山。

民间用全草入药,治风寒感冒,又外敷治蛇伤。

2c. **梗花变种** 疏麻菜(四川南川),山苏麻(四川叙永)

var. **pedunculata** (Hemsl.) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):14.1959—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var.? *pedunculatum* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:293.1890; Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**:553.1900—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *typica* Dunn f. *normalis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**(28):170.1915, p. p.—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *angustifolium* Dunn f. *normalis* Dunn in l. c., p. p., quoad Henry 5330 etc.—*Meehanian urticaefolia* (Miq.) Makino var. *pedunculata* (Hemsl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:223.1929, p. p., syn. *Dracocephalum simplex*, *Dr. esquirolii*, *Dr. pinfaense* Lévl. excludendo.—*Meehanian urticaefolia*

图版 67: **华西龙头草**(原变种) *Meehanian fargesii* (Lévl.) G. Y. Wu var. *fargesii*, 1. 植株; 2. 叶上的毛; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊。(曾孝濂绘)