

var. *angustifolia* f. *racemosa* (Dunn) Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. **56** (B):458.1937——*Dracocephalum pedunculatum* auct. non Sessé et Moc. 1894: Diels in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**:477.1922.

这一变种与原变种不同在于茎较高大粗壮，有多分枝，不形成匍匐状的分枝；聚伞花序通常具花在3枚以上，形成具明显的短或长梗的轮伞花序，在茎的上部常形成顶生假总状花序；叶通常为长三角状卵形，形状变异颇大，但均显然较原变种为大。

产湖北，湖南，广西，四川及云南；生于山地常绿林或针阔叶混交林内，海拔1400—3500米。模式标本采自湖北西部(?)。

民间用全草入药，治腹泻。

本变种的形态特征明显的向龙头草过渡，以产于较低海拔的湖南植物尤为显著。

2 d. 松林变种

var. **pinetorum** (Hand.-Mazz.) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):15. 1959——*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *pinetorum* Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Ak. Wiss. Wien. **57**:236.1925——*Meehanian pinetorum* (Hand.-Mazz.) Kudo in Mém. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:224.1929 et *M. urticifolia* (Miq.) Makino var. *pedunculata* (Hemsl.) Kudo p. p., quoad syn. *Dracocephalum simplex* Vaniot——*Meehanian urticifolia* (Miq.) Makino var. *pinetorum* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:916.1936——*Dracocephalum simplex* Vaniot in Bull. Acad. Geogr. Bot. **14**:179.1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911, fide Hand.-Mazz. e typo——*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *angustifolia* Dunn f. *normalis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**(28):170.1915, p. p., quoad syn. *Dr. simplex* Vaniot——*Meehanian urticifolia* auct. non (Miq.) Makino: 孙雄才，科学社生物所论文集**7**:234.1932, p. p., quoad specim. Tsiang 8423.

这一变种与原变种不同在于早生植物高12—45厘米，直立；叶卵形或三角状卵形，长2.5—5厘米，稍厚，下部叶柄短，长达叶片之半，上部及花序中之叶无柄或近无柄，叶片较小；花成长而稀疏的假总状花序。

产贵州中部(贵阳、龙里)；四川东南部(南川)及云南东部和东北部；生于松林内，海拔690—2700米。模式标本采自云南罗平。

本变种显系向狭叶龙头草过渡。

3. 龙头草(鄂西草药名录) 鲤鱼(湖北巴东，引自鄂西草药名录)，长穗美汉花

(植物分类学报 8 卷 1 期)

Meehanian henryi (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8** (1):15.1959—*Dracocephalum henryi* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:291. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:166.1913; Diels in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**:477.1922—*Dracocephalum cavaleriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**:422.1910; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911—*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *typica* f. *racemosa* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:170. 1915—*Meehanian urticaefolia* (Miq.) Makino var. *henryi* (Hemsl.) Kudo in Mém. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:224.1929, p. p., quoad syn. *Dracocephalum henryi* Hemsl.

3 a. 龙头草(原变种)

var. **henryi**

多年生草本,直立,高 30—60 厘米。茎四棱形,除幼嫩部分被疏柔毛及节上被柔毛外,余部无毛或几无毛。叶具长柄,柄长 10 厘米以下,向上渐变短或几无柄,腹面具槽,两侧边缘具疏长柔毛;叶片纸质或近膜质,卵状心形、心形或卵形,长 4—13 厘米,宽 1.8—4 厘米,有时长达 17 厘米,宽达 10 厘米,以着生于茎中部的叶较大,先端渐尖,基部心形,在茎上部者有时略偏斜,边缘具波状锯齿或粗齿,上面被疏微柔毛,以脉上为密,下面几无毛,脉隆起。花序腋生和顶生,为聚伞花序组成的假总状花序,有时有分枝或仅有 1 朵花腋生,花序长 6—9 厘米,密被微柔毛;苞片小,卵状披针形或披针形,长 3—6 毫米,具齿;花梗长 1—4 毫米,被微柔毛,中部具 1 对小苞片;小苞片钻形,长约 1 毫米。花萼花时狭管形,口部微开张,长 1—1.3 厘米,具 15 脉,外面被微柔毛,内面无毛,齿 5,呈二唇形,上唇 3 齿,较高,下唇 2 齿,齿均三角形,长为花萼长的 $\frac{1}{3}$,具缘毛,先端渐尖,果时萼筒基部膨大成囊状。花冠淡红紫或淡紫色,长 2.3—3.7 厘米,外面被极疏的微柔毛,有时背部具少数疏柔毛,内面在冠筒基部具柔毛,但不成毛环,冠筒直立,管状,细,上半部渐扩大,冠檐二唇形,上唇微弯,2 裂,裂片长圆形,下唇增大,伸长,3 裂,中裂片扇形,顶端微凹,内面具长柔毛,两侧裂片长圆形长为中裂片的 $\frac{1}{2}$ 。雄蕊 4,二强,内藏,后对着生于上唇下方花冠喉部,前对着生于下唇两侧裂片下方冠筒中部,花丝细,无毛,花药 2 室,被微柔毛。子房 4 裂,被微柔毛。花柱细长,略长于雄蕊,微伸出花冠,先端 2 裂,无毛。花盘杯状,裂片不明显,前方呈指状膨大。小坚果圆状长圆形,平滑,密被短柔毛,腹面微呈三棱形,基部具一小果脐。花期 9 月,果期 9 月以后。