

产湖北西部(巴东),四川东南部(南川),湖南西部(黔阳)及贵州东南部(平坝);生于低海拔地区的常绿林或混交林下。模式标本采自湖北巴东。

民间用叶外敷蛇咬伤;根浸酒服,补血。

3 b. 长叶变种

var. **kaitcheensis** (Lévl.) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):16.1959
——*Dracocephalum kaitcheense* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**:422.1910;
Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911——*Dracocephalum urticifolium*
Miq. var. *angustifolia* Dunn f. *racemosa* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh
6(28):171.1915, p. p., quoad syn. *Dr. kaitcheense* Lévl. et specim. Cavalerie
2781——*Meehanian urticaefolia* (Miq.) Makino var. *henryi* (Hemsl.) Kudo in
Mém. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:224.1929, p. p., quoad syn. *Dr. kaitche-*
ense Lévl.——*Meehanian urticaefolia* auct. non (Miq.) Makino: 孙雄才, 科学社
生物所论文集**7**:234.1932, p. p. quoad Tsiang 5728, 5747.

这一变种与原变种不同在于叶狭三角状卵圆形,基部平截至浅心形,疏生锯齿,叶柄顶端宽展;花序顶生或腋生,为由聚伞花序组成的长总状花序。

产贵州(都匀、凯里、安龙);生于山谷溪边或林下湿润处,海拔500米左右。模式本采自贵州凯里。

3 c. 圆基叶变种

var. **stachydifolia** (Lévl.) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):16. 1959
——*Dracocephalum stachydifolium* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**:422.1910;
Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911——*Dracocephalum urticifolium*
Miq. var. *angustifolia* f. *racemosa* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:171.
1915, p. p. quoad syn. *Dr. stachydifolium* Lévl. et specim. Cavalerie 1034——
Meehanian urticaefolia auct. non (Miq.) Makino: 孙雄才, 科学社生物所论文集**7**:
234.1932, p. p., quoad Tsiang 6316.

这一变种与原变种不同在于叶长椭圆状卵圆形,基部圆形,疏生尖锯齿,叶柄顶端稍宽,被具节长柔毛;花序顶生总状,较短,基部常呈三分枝。

产贵州(三合、平坝);生于山间溪边林下,海拔约700米。模式标本采自贵州平坝。

4. 肉叶龙头草 铁板青(四川峨眉),肉叶美汉花(植物分类学报 8 卷 1 期)

Meehanian faberi (Hemsl.) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):17.

1959——*Dracocephalum faberi* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:291.1890——*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *typica* Dunn f. *carnosa* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:170.1915——*Meehanian urticaefolia* (Miq.) Makino var. *faberi* (Hemsl.) Kudo in Mém. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:223.1929.

多年生草本，直立，有时具匍匐茎，高18—25厘米。茎细弱，不分枝，除幼嫩部分及节上被倒生的短柔毛或微柔毛外，余部无毛。叶通常仅有2—3对，集中于茎上部，具柄，柄长5—25毫米，向上渐变短，有时几无柄，幼嫩时密被短柔毛，腹面具槽，槽边缘被疏柔毛或长柔毛；叶片近肉质，卵形或卵状椭圆形，长5—11厘米，宽1.5—5厘米，先端急尖或渐尖，有时圆或微弯，边缘疏生波状圆齿或粗齿，稀儿全缘，上面被极疏的微柔毛或几无毛，以脉上较多，中脉凹陷，下面仅脉上被疏柔毛或极疏的短柔毛或几无毛，中脉隆起。花成对组成顶生稀腋生的假总状花序，被短柔毛或微柔毛；苞片小，卵状披针形至披针形，长2—3毫米，几无柄，被短柔毛，具缘毛，有齿或几全缘；花梗短，长约2毫米，被微柔毛，近基部具1对小苞片；小苞片钻形，长约1毫米。花萼花时管状，向口部渐开张，长1.1—1.3厘米，具15脉，外面被微柔毛，内面无毛，齿5，呈二唇形，上唇3齿，较高，下唇2齿，齿三角状卵形，长约为花萼全长的1/3，先端渐尖，具缘毛。花冠紫或粉红色，长3.5—4厘米，外面被微柔毛，内面在冠筒基部被柔毛，但不成毛环，冠筒管状，直立或微弯，上半部逐渐扩大，冠檐二唇形，上唇直立，2裂，裂片长圆形，下唇增大，3裂，中裂片近方形，顶端平截或有时成扇形，两侧裂片长圆形，与中裂片大小几相等或小1倍。雄蕊4，略二强，内藏，后对着生于上唇下方花冠喉部，前对着生于下唇侧裂片下方冠筒中部，花丝宽扁，无毛，花药二室，无毛。子房4裂，无毛。花柱细长，比雄蕊长，微伸出花冠外，先端2裂。花盘杯状，裂片不明显，前方呈指状膨大。成熟小坚果未见。花期7—9月，果期9月以后。

产四川(巫山、峨眉)，甘肃(西固)；生于混交林内，海拔约1500米。等模式标本采自四川峨眉及巫山。

5. 狭叶龙头草 狭叶美汉花(植物分类学报 8卷 1期)

Meehanian pinfaensis (Lévl.) Sun ex G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):17.1959——*Dracocephalum pinfaense* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**:422.1910; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:443.1911——*Dracocephalum esquirolii* Lévl. in l. c. 422.1910; Dunn in l. c. 443.1911——*Dracocephalum urticifolium* Miq. var. *angustifolia* Dunn f. *normalis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:170.1915, p. p., quoad syn. *Dr. esquirolii* et *pinfaense* Lévl. et