

这一变种与原变种不同在于茎较矮,常自基部至顶部分枝,叶上面密生灰白短绒毛。

产四川西部(道孚);生于阳坡,海拔 3200 米。模式标本采自四川道孚。

5. 松叶青兰 傅氏青兰(植物分类学报 8 卷 1 期) 图版 70:11—12

Dracocephalum forrestii W. W. Smith in Trans. Bot. Soc. Edinburgh **27**:90.1916; Harrow in New Fl. et Silva **1**:107, f. 26.1929; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:238. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:917.1936; G. Y. Wu in Act. Phytotax Sin **8**(1):22. 1959——*Dracocephalum tanguticum* auct. non Maxim.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**:187, 313.1912; Dunn in ibid. **6**:168.1915, p. p.

根茎粗而短,密生须状根,顶部生出多茎。茎直立,高 13—28 厘米,不分枝,或在上部具少数分枝,叶腋间生有短枝,钝四棱形,被倒向的短毛,节多,节间长 1—1.4 厘米。叶几无柄,基部具短鞘,鞘长不超过 1 毫米,叶片轮廓倒卵圆形,长 1.6—2.2 厘米,宽 1.4—2 厘米,羽状全裂,裂片 2—3 对,生于基部,稀只有 1 对生于中部,彼此相距 1—2 毫米(因此似掌状全裂),下面的与中脉成锐角斜展,上面的有时中间的一对与中脉成锐角近直展,线形,长 8—21 毫米,宽 1—1.2 毫米,上面无毛,下面被短毛,变无毛。轮伞花序生于茎分枝上部 5—10 节,长约 4—6 厘米,通常具 2 花,密集;苞片似叶,但较小,只具 1 对裂片,长约为萼之 2/3 或 1/2。花萼长 1.6—1.8 厘米,外密被短柔毛及短睫毛,2 裂至 3/7 或 2/5 处,上唇 3 裂至本身 4/5 处,3 齿近等大,中齿稍长,披针形,先端钻状锐渐尖,下唇 2 裂稍超过本身基部,齿似上唇之齿,但稍短。花冠蓝紫色,长 2.5—2.8 厘米,外被短柔毛。花丝疏被毛。花期 8—9 月。

产云南西北部(丽江、中甸);生于亚高山多石的灌丛草甸中,海拔 2300—2750—3500 米。模式标本采自云南丽江。

6. 白萼青兰 图版 70:9—10

Dracocephalum isabellae Forrest ex W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:211.1914; Stapf in Curtis's Bot. Mag. **148**:pl. 8952.1923; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:237.1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:917. 1936 "Isabellea"; G. Y. Wu in Act. Phytotax Sin. **8**(1):21.1959.

多年生草本。茎直立,高 30—50 厘米,直立,不分枝,钝四棱形,在棱上密被倒向的短柔毛,节多数,节间长 3—4 厘米,在上部生花序部分稍变短。叶几无柄,基部具短鞘,轮廓阔卵形或菱状卵形,长 2—2.8 厘米,宽 2.6—3.8 厘米,羽状全裂,裂片 2—

