

多年生草本。叶柄远较叶片为短。苞片每侧具 1—8 齿，齿具长尖或芒状刺。

8. 羽叶枝子花

Dracocephalum bipinnatum Rupr. in Mem. Acad. Sci. St. Pétersb. ser. 7, 14: 66. 1869; Lipsky in Act. Hort. Petrop. 26: 595. 1910; Schischk. in Fl. URSS 20: 464, pl. XXVI, f. 3. 1954 — *Dracocephalum ruprechtii* Regel in Act. Hort. Petrop. 6: 563. 1880; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 666. 1885 — *Dracocephalum ruprechtianum* Regel in Gartenfl. 24: tab. 1018. 1880.

8 a. 羽叶枝子花(原变种) 图版 68: 13—14

var. **bipinnatum**

根茎斜，粗 5—10 毫米。茎多数，常在基部或中部具分枝，高 15—30 厘米，四棱形，疏被倒向小毛，上部稍密，在叶腋生有极短的小枝。下部茎生叶具长度超过叶片之半的长柄，中部茎生叶具短柄，叶片干时纸质，羽状深裂几达中脉，长 1.5—2.5 厘米，宽 7—12 毫米，轮廓卵形至披针形，基部楔形，深裂片 3—4 对，线形，斜升，长 4—8 毫米，顶端的长 10—14 毫米，宽约 1.5 毫米，先端钝，下面脉上疏被小毛，全缘，或有时具少数小裂片，叶因此为二回羽状分裂。轮伞花序生于茎顶部 2—5 对叶腋，约具 4 花；花具短梗；苞片长为萼的 1/4—1/2，倒卵状椭圆形或披针形，基部楔形，被短柔毛及睫毛，边缘的 4—8 个小齿具细刺，刺长 1—2 毫米。花萼长 14—17 毫米，被短毛及睫毛并具金黄色腺点，2 裂达 1/2，上唇 3 浅裂至本身长度 1/4—1/3 处，3 齿阔卵形，几等大，先端具刺，刺长约 0.8 毫米，下唇 2 深裂几至基部，2 齿宽披针形，先端具小刺。花冠蓝紫色，长 3—3.8 厘米，外面被短柔毛，上唇稍短于下唇。雄蕊无毛。花期 8—9 月。

产新疆西部，西藏西部；生于山溪石缝中，草原或半沙漠，海拔 2500—2600 米。苏联，克什米尔地区也有。模式标本采自苏联。

8 b. 短裂变种

var. **brevilobum** C. Y. Wu et W. T. Wang in Addenda 591. 1977.

这一变种与原变种不同在于叶羽状浅裂，裂片 1—3，深仅及叶宽的一半或稍过之。有时 1—2 裂片有尖刺齿；花序较本种更延长，稀疏而间断。

产新疆西部(温泉)；生于山坡。模式标本采自新疆温泉。

图版 69: 羽叶枝子花二花变种 *Dracocephalum bipinnatum* Rupr var *biflorum* C. Y. Wu. 1. 植株上部，示花序；2. 花，侧面观；3. 花萼纵剖，内面观；4. 花冠纵剖，内面观；5. 雌蕊。
(曾孝濂绘)