

状卵形,长度为萼之 $1/2$ 或 $1/3$,边缘具 1—2 极小的齿,齿具长几达 1 毫米的刺。花萼常为紫色,长 10—13 毫米,被小毛及短睫毛,明显二唇形,2 裂几达 $1/2$,上唇 3 裂至本身长度的 $1/4$,3 齿几等大,三角状卵形,先端具较齿稍短的刺,下唇 2 裂超过本身长度之 $1/2$,齿披针形,针状渐尖。花冠蓝紫色,长 2.2—2.8 厘米,外面疏被短柔毛,上唇稍短于下唇。雄蕊无毛。花期 6—8 月。

产新疆西北部(托里);生于高山草原石缝中。苏联,蒙古也有。模式标本采自苏联西伯利亚。

系 2. 短花枝子花系——Ser. *Breviflorae* C. Y. Wu et W. T. Wang in *Addenda* 592.1977.

多年生草本。苞片多少全缘。萼二唇,分裂至近底部。

11. 短花枝子花

Dracocephalum breviflorum Turrit in Kew Bull. 1922:154.1922.

草本。茎直立或近斜升,具短细刚毛。叶椭圆状披针形,先端锐尖或近锐尖,基部圆或近心形,长达 3 厘米,宽达 1.4 厘米,上面被细刚毛,下面近于被疏长毛,边缘具圆齿状牙齿,下部叶片中肋及脉突出,上部的下陷,侧脉两侧各 5—7。花序近穗状的头状,长 3 厘米;苞片近叶状,但较小而边缘多少全缘;小苞片或线状披针形,锐尖,长 0.6—1.1 厘米,被腺状细刚毛。花萼外被细刚毛及无柄腺体,二唇形,分裂至近底部,筒长 1 毫米,上唇长 6.5 毫米,3 浅裂,裂片披针形,锐尖,长 2 毫米,3 脉,下唇长 5.5 毫米,2 裂,裂片狭披针形,向顶渐狭,渐尖,长 3.5 毫米。花冠紫,冠筒长 1 厘米,喉部宽展,外面微具细刚毛,冠檐二唇形,上唇 2 浅裂,裂片近圆形,长 2 毫米,下唇 3 浅裂,侧裂片近圆形,长 1.5 毫米,中裂片凹入颇深,长 3 毫米,宽 4.5 毫米,中线有疏长毛。雄蕊微伸出,无毛。花柱长 1.3 厘米,无毛。花期 7 月。(标本未见,摘自原描写)。

产西藏南部;生于海拔约 4000 米的高山草甸上。模式标本采自我国西藏的珠穆朗玛峰北坡下。

系 3. 香青兰系——Ser. *Foetidae* Schischk. in Fl. URSS 20:462.1954.

一年生草本。下部叶之柄与叶片等长,或较长,或较短。

12. 香青兰(中国经济植物志,下册) 摩眼子(辽宁),山薄荷(吉林),蓝秋花、玉米草、香花子(河北),臭仙欢、臭蒿、青蓝(山西),野青兰(陕西),青兰(甘肃)