

齿近等大,卵状三角形,长约3毫米,先端锐尖;下唇2裂至基部,齿似上唇之齿,但较狭,长约3毫米。花冠蓝紫色,长2.5—3.7厘米,外被柔毛。雄蕊不伸出,花丝疏被毛。花期7—8月。

产新疆(阿尔泰及天山东段);生于海拔2400—2500米间山地草坡。苏联也有。模式标本采自苏联西伯利亚。

系3.毛建草系——Ser. *Grandiflorae* G. Y. Wu et W. T. Wang in *Addenda* 592.1977.

茎生叶2—3对,具圆齿。萼上唇之齿不相等,中齿较侧齿宽2倍以上或极宽而具齿。

19. 美花毛建草

Dracocephalum wallichii Sealy in Curtis's Bot. Mag. **164**:sub t. 9657. 1944——*Dracocephalum calanthum* G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):24. 1959, p. p.——*Dracocephalum speciosum* Benth. in Wall. Cat. n. 2128.1829, nom. nud., in Wall. Pl. Asia Rar. **2**:65.1831, descr., Labiat. Gen. et Sp. 493. 1834, et in DC. Prodr. **12**:399.1848; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. **102**:t. 6281. 1876; Fl. Brit. Ind. **4**:665.1885, non *Dr. speciosum* Sweet——*Dracocephalum bullatum* auct. non Forrest ex Diels; G. Y. Wu in l. c., p. p. min., quoad specim. Tibet.

19 a. 美花毛建草(原变种) 图版71:7—8

var. **wallichii**

根茎直,短而粗,生出须状粗根。茎直立或渐升,长24—50厘米,钝四棱形或近

图版71: 1—4.光萼青兰 *Dracocephalum argunense* Fisch ex Link., 1.植株上部; 2.苞片; 3.花萼纵剖,内面观; 4.花药及花丝顶部。5—6.青兰 *Dracocephalum ruyschiana* Linn., 5.苞片; 6.花萼纵剖,内面观。7—8. 美花毛建草(原变种) *Dracocephalum wallichii* Sealy var. **wallichii**, 7.苞片; 8.花萼纵剖,外面观。9—11.掌叶青兰 *Dracocephalum palmatoides* C Y Wu et W T Wang, 9.叶; 10.苞片; 11.花萼纵剖,外面观。12—13.无髭毛建草 *Dracocephalum imberbe* Bunge, 12.苞片; 13.花萼纵剖,外面观。14—16.大花毛建草 *Dracocephalum grandiflorum* Linn., 14.苞叶; 15.苞片; 16.花萼纵剖,外面观。17—18.皱叶毛建草 *Dracocephalum bullatum* Forrest ex Diels, 17.苞片; 18.花萼纵剖,外面观。19—20.绒叶毛建草 *Dracocephalum velutinum* G. Y. Wu et W. T. Wang, 19.苞片; 20.花萼纵剖,外面观。(赵宝恒绘)