

圆状倒卵形至倒卵形,全缘有数小齿,中间1—3齿具刺尖;花冠长约为萼的1倍,筒宽约0.3厘米。

产四川西南部(贡噶岭);生于海拔约4000米的灌丛边。模式标本采自四川贡噶岭。

20. 绒叶毛建草

Dracocephalum velutinum G. Y. Wu et W. T. Wang, 云南植物志 1:588. 图 142:9—11. 1976——*Dracocephalum calanthum* G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1):24. 1959, p. p.——*Dracocephalum bullatum* auct. non Forrest ex Diels: G. Y. Wu in l. c. p. p. min. quoad specim. Ghing 24163.

20 a. 绒叶毛建草(原变种) 图版 71:19—20

var. **velutinum**

根茎短,直或斜,粗7—8毫米,下面生出长而粗的根,顶端生出1—2茎及4—5基出叶。茎渐升或近直立,长10—15厘米,钝四棱形,密被倒向的短柔毛,在花序之下具2—3节。基出叶具柄,叶片卵形至圆卵形,先端圆形,基部心形或深心形,长2—5(—6.5)厘米,宽1.8—4厘米,上面几无毛,网脉下陷,下面带紫红色,密被白色短绒毛或仅沿脉网密被绢状短柔毛,网脉不显,缘密生圆牙齿,叶柄长为叶片之1—2倍,长2—6.7厘米,被倒向短毛;茎生叶2—3对,似基出叶但较短小,叶片长1.5—2.1厘米,叶柄与叶片近等长或较短。轮伞花序密集,头状,长约3厘米;苞片约与萼等长或稍短,菱状倒卵形至扁圆形,紫绿色,两面沿脉密被长柔毛,缘被长睫毛,每侧具3—5齿,齿锐尖或具短刺。花萼长1.8—2厘米,外面沿脉被绢状长柔毛,内面疏被长柔毛,缘被绵毛状长睫毛,2裂至中部,上唇3裂近本身基部,中齿较侧齿宽2—3倍,椭圆状倒卵形或近倒梯形,先端截圆形,具不规则的小牙齿,中央的小齿或有时数小齿均具短刺,侧齿披针形,先端刺状渐尖,下唇2裂至基部,齿似上唇侧齿,但较狭。花冠深蓝色,较萼稍长,长2—2.4厘米,最宽达0.7厘米,外被短柔毛,冠檐二唇形,上唇长约0.5厘米,顶端微凹,下唇长2倍,中裂片倒心脏形,侧裂片卵状三角形。雄蕊不伸出,花丝疏被短毛。花期7—8月。

产云南西北部(中甸、鹤庆);生于海拔3400—3650(4000)米间山谷草坡。模式标本采自云南中甸。

20 b. 圆齿变种

var. **intermedium** G. Y. Wu et W. T. Wang, 云南植物志 1:588. 1976.——*Dracocephalum calanthum* G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1):24. 1959,