

约 11 毫米,外面上部密被小毛,近边缘处被长柔毛,下部无毛。 花期 7 月。

产新疆西北部(托里);生于山坡上。模式标本采自新疆托里。

### 29. 铺地青兰 图版 68:7—8

**Dracocephalum origanoides** Steph. ex Willd. Sp. Pl. **3**:151. 1800;  
Schischk. in Fl. URSS **20**:445. 1954——*Dracocephalum pinnatum* Linn. var. *soungaricum* Lipsky in Act. Hort. Petrop. **26**:605. 1910——*Dracocephalum pinnatum*  
auct. non Linn.:Lipsky in ibid. 604. 1910.

根茎近横走,粗约 5 毫米,生出多数低矮而密集的茎。茎高约 3—5 厘米,渐升或近直立,通常不分枝,只生叶的茎短,长 2—4 厘米,生花的茎长 3—7 厘米,不明显四棱形,密被倒向的短毛,常带紫色。叶小,具柄,叶柄与叶片等长或过之,被小毛,有时又夹有长柔毛,叶片羽状深裂,轮廓卵形,先端钝,基部突然宽楔形或带心形,长 3—5 毫米,宽 2.5—4.5 毫米,裂片 3 对,最下面者基部具一斜下的小裂片(叶片因此成鸡足状),宽卵形至长圆形,先端钝,边缘常反卷,上面被短毛,中脉及侧脉下陷,下面密被白色短绒毛。轮伞花序生于茎上部 2—5 对叶腋,占长度 1.2—3 厘米,密集;花具短梗;苞片长与花萼近等长或稍短,倒卵状披针形,被短柔毛及长睫毛,上部通常具 3 齿,稀全缘。花萼长 7—8 毫米,被短毛及睫毛,2 裂近中部,上唇 3 裂超过本身 1/2,中齿倒卵圆形,侧齿宽披针形,下唇 2 裂几达基部,先端刺状渐尖,尖头长不到 1 毫米。花冠蓝色,长达 12 毫米。小坚果黑色,长圆形。 花期 6—7 月,果期 8 月。

产新疆北部(阿尔泰及天山东部);生于海拔 1700—2500 米间山坡草地或冲积地区干旱的土丘上。苏联,蒙古也有。模式标本采自苏联西伯利亚。

### 30. 宽齿青兰

**Dracocephalum paulsenii** Briq. in Bot. Tidsskr. **28**:238, fig. 4. 1908;  
Schischk. in Fl. URSS **20**:448. 1954——*Dracocephalum discolor* auct. non Bunge:  
Lipsky in Act. Hort. Petrop. **26**:599. 1910.

草本匍匐,矮小。根茎粗约 8 毫米,顶端分枝。茎多数,高 5—15 厘米,密被平展短毛。叶卵形,长宽均约 3—4 毫米,圆齿状羽状深裂,裂片边缘内卷,上面绿色,被短伏毛,下面被白绒毛,叶柄长 2—3 毫米。轮伞花序在枝顶密集成球状卵形或长圆形的穗状花序,长 2—3 厘米,宽 1.5 厘米;苞片椭圆形,羽状深裂,裂片先端微钝,紫色或紫蓝色,疏被长柔毛。花萼管状钟形,长 6—7 毫米,被平展疏柔毛,二唇形,上唇中齿极宽卵形,侧齿狭卵形,与中齿合生较高,下唇二齿卵状披针形,齿先端均短渐尖。花冠紫蓝色,长 10—12 毫米,外面密被短伏毛,斑点颜色稍深,冠筒在萼齿以上向前

