

产四川南部;生于溪旁,海拔 750 米。

1 c. 狭叶变种

var. *lanceolata* (Barton) Fernald in *Rhodora* **15**:182. 1913——*Prunella lanceolata* Barton, *Comp. Fl. Philoci* **2**:37. 1818——*Brunella vulgaris* Linn.
var. *elongata* Benth. in *DG. Prodr.* **12**:411. 1848.

这一变种与原变种不同在于叶全缘,披针形至长圆状披针形,长 1.5—4 厘米,宽 6—10 毫米,无毛或疏生柔毛。

产云南,四川;生于路旁,草坡,灌丛及林缘等处,海拔达 3200 米。

2. 山菠菜 (山东) 灯笼头 (江苏)

Prunella asiatica Nakai in *Rep. Veg. Kanihōchi* no. **243**:29. 1928, nom. nud.; et in *Bot. Mag. Tokyo* **44**:19. 1930, descr.; Kitagawa, *Lineam. Fl. Mansh.* **384**. 1939; 刘慎谔等, *东北植物检索表* 320, pl. 110, f. 1. 1959 ——*Prunella vulgaris* auct. non Linn.: Thunb. *Fl. Jap.* 250. 1784; Sieb. et Zucc. *Fl. Jap. Fam. Nat.* in *Abh. Bayer. Akad. Wiss. Math. Phys. Cl.* **4**(2):157. 1846; A. Gray, *Pl. Jap.* 316. 1856; Miq. *Prol. Fl. Jap.* **42**. 1865; Franch. et Sav. *Enum. Pl. Jap.* **1**:376. 1875 “*Brunella*”; Komarov in *Act. Hort. Petrop.* **25**:359. 1907, saltem pro parte, “*Brunella*”.

2 a. 山菠菜 (原变种)

var. *asiatica*

多年生草本,具有匍匐茎及从下部节上生出的密集须根。茎多数,从基部发出,上升,下部多少伏地,高 20—60 厘米,钝四棱形,具疏柔毛,尤以上部为甚,紫红色。茎叶卵圆形或卵圆状长圆形,长 3—4.5 厘米,宽 1—1.5 厘米,先端钝或近急尖,基部楔形或渐狭,上面绿色,贴生微疏柔毛或近无毛,下面淡绿色,在脉上被微疏柔毛,边缘疏生波状齿或圆齿状锯齿,侧脉 3—4 对,上面多少凹陷,下面稍隆起,叶柄显著,长 1—2 厘米,腹平背凸,多少具狭翅,被疏柔毛;花序下方的 1—2 对叶较狭长,近于宽披针形,叶柄短或近于无柄。轮伞花序 6 花,聚集于枝顶组成长 3—5 厘米的穗状花序,每一轮伞花序下方均承以苞片;苞片向上渐变小,扁圆形,宽大,长 5—8 毫米,宽 6—15 毫米,先端染红色,具长 2—3 毫米尾状尖头,膜质,有自基部放射状的脉,脉在

图版 76: 夏枯草 (原变种) *Prunella vulgaris* Linn. var. *vulgaris*, 1. 植株; 2. 花及苞片; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雄蕊上部, 示花丝先端二裂, 一裂片能育而具花药; 6. 雌蕊; 7. 小坚果, 腹面观。(曾孝谦绘)