

边缘上闭锁,显著,外面在脉上及边缘内方具疏柔毛,边缘上有纤毛,内面无毛;花梗短,长约2毫米,被柔毛。花萼连齿在内长约10毫米,先端红色或紫色,筒长4毫米,陀螺状,外面被白色具节柔毛,内面无毛,萼檐二唇形,上唇扁平,宽大,近圆形,宽约6毫米,明显具网脉,外面在两侧肋上具疏柔毛,两侧边缘具纤毛,先端有3个近截形的短齿,中齿最宽大,齿间不明显,齿尖长1毫米,为刺芒状,下唇较狭,宽3.5毫米,2深裂,裂片达唇片长之半,披针形,具脉,边缘具缘毛,先端具小刺尖。花冠淡紫或深紫色,长18—21毫米,冠筒长约10毫米,中部以上骤然增大,外面无毛,内面近基部1/3具近水平向的鳞毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长9毫米,宽6毫米,内凹,龙骨状,先端微缺,外面在脊上稍具微柔毛或近于无毛,下唇宽大,长约8毫米,宽约9毫米,3裂,中裂片较大,近圆形,边缘具流苏状小裂片,侧裂片长圆形,细小,下垂。雄蕊4,前对长很多,均上升至上唇片之下,彼此分离,扁平,极无毛,花丝先端2裂,1裂片具花药,1裂片超出于花药之上,花药2室,室极叉开。花柱丝状,伸出雄蕊之上,先端相等2浅裂。花盘近平顶。子房棕褐色,无毛。小坚果卵珠状,长1.5毫米,宽1毫米,顶端浑圆,棕色,无毛。花期5—7月,果期8—9月。

产黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,江苏,浙江,安徽及江西;生于路旁、山坡草地、灌丛及潮湿地上,海拔可达1700米。日本,朝鲜也有。模式标本采自日本。

全草入药,江苏民间用作利尿,降血压,治淋病及瘰癧,又可当茶饮。

2b. 白花变种

var. **albiflora** (Koidz.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **44**:21. 1930—*Prunella vulgaris* Linn. var. *albiflora* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo **29**:310. 1915; Makino et Nemoto, Fl. Jap. 257. 1925.

这一变种与原变种不同在于花白色。

产江苏;生于路旁。模式标本采自日本。

3. 硬毛夏枯草

Prunella hispida Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:919. 1936—*Brunella vulgaris* Linn. var. *hispida* Benth. in DC. Prodr. **12**:410. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:670. 1885.—*Brunella ovata* Wall. Cat. 2133. 1829, nom. nud.—*Prunella stolonifera* Lévl. et Giraudias in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**:296. 1913.

多年生草本,具密生须根的匍匐地下根茎。茎直立上升,基部常伏地,高15—30厘米,钝四棱形,具条纹,密被扁平的具节硬毛。叶卵形至卵状披针形,长1.5—3厘

米,宽1—1.3厘米,先端急尖,基部圆形,边缘具浅波状至圆齿状锯齿,两面均密被具节硬毛,间或有时多少脱落,侧脉2—3对,不明显,叶柄长0.5—1.5厘米,近于扁平,近叶基处有不明显狭翅,被硬毛;最上一对茎叶直接下承于花序或有一小段距离,近于无柄。轮伞花序通常6花,多数密集组成顶生长2—3厘米宽2厘米的穗状花序,每一轮伞花序其下承以苞片,苞片宽大,近心脏形,宽0.8—1厘米,先端具长约2毫米的骤然长渐尖的尖头,外面密被具节硬毛,内面无毛,边缘明显具硬毛,膜质,脉纹放射状,自基部发出,先端网结,多少显著;花梗极短,长不及1毫米,具硬毛。花萼紫色,管状钟形,连齿在内长约1厘米,背腹扁平,脉10,显著,其间网脉连结,脉上明显有具节硬毛,齿缘具纤毛,萼檐二唇形,上唇扁平,宽大,近圆形,长6毫米,宽近5毫米,先端近截形,具3个短尖齿,中齿宽大,侧齿细小,下唇较窄,宽约3毫米,2深裂,裂片达唇片的中部,披针形,具刺尖头。花冠深紫至蓝紫色,长约15(18)毫米,冠筒长10毫米,近基部宽约1.5毫米,向上在前方逐渐膨大,在喉部稍为缢缩,宽达4毫米,外面无毛,内面近基部有一略倾斜的鳞毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长约5毫米,宽约4毫米,龙骨状,内凹,先端微缺,外面在脊上有一明显的硬毛带,内面无毛,下唇宽大,长5毫米,宽6毫米,3裂,中裂片较大,近圆形,边缘具波齿状小裂片,侧裂片长圆形,细小,下垂。雄蕊4,前对较长,均伸出冠筒,花丝分离,扁平,无毛,前对花丝在顶端明显有长过于花药的钻形裂片,后对者则不甚显著,花药2室,室极叉开。花柱丝状,略伸出雄蕊之上,先端相等2浅裂。花盘近平顶。子房棕褐色,无毛。小坚果卵珠形,长1.5毫米,宽1毫米,背腹略扁平,顶端浑圆,棕色,无毛。花、果期自6月至翌年1月。

产云南,四川西南部;生于路旁,林缘及山坡草地上,海拔1500—3800米。印度,锡金也有。模式标本采自印度东北部。

4. 大花夏枯草

Prunella grandiflora (Linn.) Jacq. Fl. Austr. 4:40. 1776; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 417. 1834; Boriss. in Fl. URSS 20:496. 1954—*Prunella vulgaris* Linn. β . *grandiflora* Linn. Sp. Pl. 600. 1753—*Brunella grandiflora* Moench, Meth. Pl. 414. 1794; Benth. in DC. Prodr. 12:409. 1848; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:241. 1897.

多年生草本;根茎匍匐地下,在节上有须根。茎上升,高15—60厘米,钝四棱形,具柔毛状硬毛。叶卵状长圆形,长3.5—4.5厘米,宽2—2.5厘米,先端钝,基部近圆形,全缘,两面疏生硬毛,但下面毛常脱落,边缘具细缘毛,叶柄长2.5—4厘米,背腹