

米,宽1—1.3厘米,先端急尖,基部圆形,边缘具浅波状至圆齿状锯齿,两面均密被具节硬毛,间或有时多少脱落,侧脉2—3对,不明显,叶柄长0.5—1.5厘米,近于扁平,近叶基处有不明显狭翅,被硬毛;最上一对茎叶直接下承于花序或有一小段距离,近于无柄。轮伞花序通常6花,多数密集组成顶生长2—3厘米宽2厘米的穗状花序,每一轮伞花序其下承以苞片,苞片宽大,近心脏形,宽0.8—1厘米,先端具长约2毫米的骤然长渐尖的尖头,外面密被具节硬毛,内面无毛,边缘明显具硬毛,膜质,脉纹放射状,自基部发出,先端网结,多少显著;花梗极短,长不及1毫米,具硬毛。花萼紫色,管状钟形,连齿在内长约1厘米,背腹扁平,脉10,显著,其间网脉连结,脉上明显有具节硬毛,齿缘具纤毛,萼檐二唇形,上唇扁平,宽大,近圆形,长6毫米,宽近5毫米,先端近截形,具3个短尖齿,中齿宽大,侧齿细小,下唇较窄,宽约3毫米,2深裂,裂片达唇片的中部,披针形,具刺尖头。花冠深紫至蓝紫色,长约15(18)毫米,冠筒长10毫米,近基部宽约1.5毫米,向上在前方逐渐膨大,在喉部稍为缢缩,宽达4毫米,外面无毛,内面近基部有一略倾斜的鳞毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长约5毫米,宽约4毫米,龙骨状,内凹,先端微缺,外面在脊上有一明显的硬毛带,内面无毛,下唇宽大,长5毫米,宽6毫米,3裂,中裂片较大,近圆形,边缘具波齿状小裂片,侧裂片长圆形,细小,下垂。雄蕊4,前对较长,均伸出冠筒,花丝分离,扁平,无毛,前对花丝在顶端明显有长过于花药的钻形裂片,后对者则不甚显著,花药2室,室极叉开。花柱丝状,略伸出雄蕊之上,先端相等2浅裂。花盘近平顶。子房棕褐色,无毛。小坚果卵珠形,长1.5毫米,宽1毫米,背腹略扁平,顶端浑圆,棕色,无毛。花、果期自6月至翌年1月。

产云南,四川西南部;生于路旁,林缘及山坡草地上,海拔1500—3800米。印度,锡金也有。模式标本采自印度东北部。

4. 大花夏枯草

Prunella grandiflora (Linn.) Jacq. Fl. Austr. 4:40. 1776; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 417. 1834; Boriss. in Fl. URSS 20:496. 1954—*Prunella vulgaris* Linn. *β. grandiflora* Linn. Sp. Pl. 600. 1753—*Brunella grandiflora* Moench, Meth. Pl. 414. 1794; Benth. in DC. Prodr. 12:409. 1848; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:241. 1897.

多年生草本;根茎匍匐地下,在节上有须根。茎上升,高15—60厘米,钝四棱形,具柔毛状硬毛。叶卵状长圆形,长3.5—4.5厘米,宽2—2.5厘米,先端钝,基部近圆形,全缘,两面疏生硬毛,但下面毛常脱落,边缘具细缘毛,叶柄长2.5—4厘米,背腹

扁平,具硬毛;花序下方的一对叶长圆状披针形,无柄。轮伞花序密集组成长4.5厘米的长圆形顶生花序,其下方不直接承以叶片,每一轮伞花序下承以苞片;苞片宽大,心形,先端具小尖头,向上逐渐细小,膜质,脉纹放射状,在边缘内方网结,外面在脉上疏被柔毛,边缘具缘毛,内面无毛;花梗短,长约1毫米,具柔毛状硬毛。花萼连齿在内长8毫米,外面沿脉上疏生硬毛,内面无毛,筒长3毫米,萼檐二唇形,上唇近圆形,长宽约5毫米,先端近圆形,具3齿,齿为宽三角形,具小刺尖头,侧齿稍长,下唇长圆形,长6毫米,宽3毫米,2裂,裂片达唇片中部,披针形,具刺状尖头。花冠蓝色,长20—27毫米,冠筒长9毫米,弯曲,内面近基部有斜向鳞毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长1.2厘米,宽0.7厘米,向下弯曲,下唇宽大,3裂,中裂片较大,边缘具波齿状小裂片,侧裂片下垂。雄蕊4,前对较长,均延伸至上唇片之下,花丝分离,扁平,无毛,顶端有不明显的钝齿,花药2室,室极叉开。花柱丝状,伸出雄蕊之上,先端相等2浅裂,裂片钻形。花盘近平顶,波状。小坚果近圆形,略具瘤状突起,在边缘及背面明显具沟纹。花期9月,果期9月以后。

我国南京曾引种栽培。原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。模式标本采自西欧。

2. 铃子香亚族——Subtrib. Melittinae Briq.

Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4, 3a**:207, 242. 1897; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:150. 1929; Pojark. in Fl. URSS **20**:498. 1954——*Stachydeae* subtrib. *Melitteae* Benth. in DC. Prodr. **12**:407. 1848; et in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**:1168. 1876.

30. 铃子香属——*Chelonopsis* Miq.

Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **2**:111. 1865.

草本或半灌木至灌木,直立。叶具锯齿、圆齿或犬齿乃至重锯齿。轮伞花序腋生,疏花,2—10花;花大,美丽,白色,黄色至紫红色;花叶与茎叶同形。花萼膜质,钟形,花后膨大,10脉,齿4—5,三角形,等大或近等大,或明显呈二唇形,后一情况下唇具3齿,下唇具2齿。花冠筒近基部向前方膨大,长伸出,内面无毛环,冠檐二唇形,唇片短而宽,上唇短小,直立,全缘或微凹,下唇较长,近开展,3裂,中裂片最大,先端微凹或边缘波状至牙齿。雄蕊4,前对较长,均延伸至上唇片之下,花丝扁平,具微柔毛,花药成对靠近,2室,明显叉开,前方具须毛。花盘平顶或斜向而后裂片呈指状。