

小苞片线状披针形,长约1厘米,宽约1.5毫米,背面被微柔毛。花萼钟形,连齿长1.8厘米,筒长约1.3厘米,外面被微柔毛,内面无毛,10脉,其间网脉明显,齿5,三角形,长5毫米,长渐尖。花冠长3厘米,外面除冠筒基部外密被柔毛,内面无毛,冠筒长2.6厘米,伸出萼筒很多,喉部膨大,冠檐二唇形,上唇卵圆形,长4毫米,下唇3裂,中裂片倒心脏形,先端微凹。雄蕊4,前对较长,花丝丝状,扁平,被微柔毛,花药卵圆形,具须毛。花柱丝状,无毛,伸出药外,先端等2浅裂。花盘斜向。未成熟小坚果黑褐色,具条纹。花期10月。

产陕西,甘肃;生于谷地灌丛中,海拔750米。等模式标本采自陕西太白山及宝鸡妙王山。

5. 齿唇铃子香

Chelonopsis odontochila Diels in Notes Bot Gard. Edinburgh 5:240. 1912; in ibid 7:6, 45, 313. 1912, ibid. 7:347. 1913; Dunn in ibid. 6:178. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci Agr. Taihoku Univ 2:153. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin 7:919. 1936; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1):29. 1959—*Chelonopsis odontochila* Diels ssp. IV. *odontochila* (Diels) Kudo, l. c. 154. 1929.

5 a. 齿唇铃子香(原变种) 图版 78:1—5

var. *odontochila*

小灌木,高1—2米。茎近圆柱形,密被短柔毛,间夹有稀疏的长刺毛,多分枝。叶卵圆形,长3—5厘米,宽1.5—3厘米,先端近渐尖,基部心形,纸质,边缘具细密圆锯齿,微皱,两面均被疏柔毛,侧脉约4对,上面凹陷,下面隆起;叶柄长1.5—2厘米,被短柔毛。聚伞花序1—3花,通常3花;总梗长1—2厘米,花梗长0.5—0.7厘米,均被短柔毛;小苞片线状披针形,长4—6毫米,宽约1毫米,具纤毛。花萼钟形,连齿长1厘米,筒长8毫米,果时花萼增大,长可达1.5厘米,外面疏被柔毛,内面无毛,10

图版 78: 1—5. 齿唇铃子香(原变种) *Chelonopsis odontochila* Diels var. *odontochila*. 1. 植株上部; 2. 花萼纵剖, 内面观; 3. 花冠纵剖, 内面观; 4. 雌蕊; 5. 小坚果。6. 齿唇铃子香钝齿变种 *Chelonopsis odontochila* Diels var. *smithii* (Kudo) C Y Wu, 6. 花, 侧面观。7—8. 玫红铃子香 *Chelonopsis rosea* W W Smith, 7. 叶; 8. 花, 侧面观。9—10. 多毛铃子香 *Chelonopsis mollissima* C Y Wu, 9. 叶; 10. 花, 侧面观。11—12. 丽江铃子香 *Chelonopsis lichiangensis* W. W. Smith, 11. 叶; 12. 花, 侧面观。13. 具苞铃子香 *Chelonopsis bracteata* W. W. Smith, 13. 花苞。14—15. 假具苞铃子香(原变种) *Chelonopsis pseudobraeteata* C. Y. Wu et H. W. Li var. *pseudobraeteata*, 14. 叶; 15. 花萼。(曾孝濂绘)