

长3—4厘米,宽0.8—1.2厘米,外面密被柔毛,内面无毛,冠檐二唇形,上唇短小,长3毫米,宽7毫米,近全缘,下唇大,3裂,中裂片长6毫米,宽10毫米,边缘近于无齿,侧裂片长约3毫米,宽约5毫米。雄蕊4,均内藏,前对较长,花丝丝状,扁平,具微柔毛,花药卵圆形,2室,平叉开,两端具须毛。花盘斜向,后裂片伸长。子房无毛。花柱细长,伸出药外,先端近等2浅裂,裂片钻形。小坚果长椭圆形,长11毫米,宽4毫米,先端具翅,棕褐色,具细脉。花期9—10月,果期11—12月。

产云南西部、西南部;生于开旷的灌丛中,海拔1600—3100米。模式标本采自云南大理。

7. 多毛铃子香 图版 78:9—10

Chelonopsis mollissima C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):151. 1965.

灌木,高1米。枝近圆柱形,极密被疏柔毛,多叶。叶卵圆状圆形,长3—5厘米,宽2.5—4.5厘米,先端锐尖,基部近心形,边缘具粗大圆齿状锯齿,齿尖具胼胝体,两面密被疏柔毛,坚纸质,侧脉4—5对,与中肋在上面稍凹陷下面显著;叶柄长1.5—2.5厘米,近圆柱形,极密被疏柔毛。聚伞花序腋生,1—2出,具1—3花,通常于腋生具叶的小短枝上顶生;总梗长4—8毫米,花梗长1—2毫米,二者均密被疏柔毛;苞片卵圆形或倒披针形,长约7毫米,宽2—3毫米,叶状,两面均密被疏柔毛。花萼钟形,连齿长1.5厘米,外面密被疏柔毛,内面被微柔毛,10脉,居间脉在齿间凹缺处下方略增大,其间横脉连接,齿5,长三角形,长7毫米,先端渐尖,具刺尖头。花冠玫瑰红至红色,长3.2厘米,外面疏被柔毛,内面无毛,冠筒长2.5厘米,喉部膨大,冠檐二唇形,上唇短小,长3毫米,宽7毫米,先端凹缺,下唇长9毫米,宽15毫米,3裂,中裂片较大,倒梯形,先端凹缺,侧裂片卵圆形。雄蕊4,前对较长,花丝丝状,扁平,具小疏柔毛,花药卵珠形,具须毛。花柱丝状,无毛,伸出药外,先端等2浅裂。花盘斜向。子房黑褐色,无毛。花期11—12月。

产云南北部金沙江河谷;生于干暖河谷开旷坡地灌丛中,海拔1200—1700米。模式标本采自云南禄劝。

系2. 丽江铃子香系——Ser. Lichiangenses C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):152. 1965.

小枝密被平展刺毛及具腺小疏柔毛。

8. 丽江铃子香 图版 78:11—12

